


# Ayundando a las Madres y Bebés a Sobrevivir Preeclampsia y Eclampsia

PLAN DE ACCION 2-CUIDADOS AVANZADOS

## PREECLAMPSIA GRAVE

Preeclampsia y uno o más  
signos de alerta



## ECLAMPSIA

Convulsiones o Inconsciencia



Maneje  
convulsiones  
con seguridad


**Recibir derivación o continuar cuidados**

**Iniciar o continuar  $MgSO_4$**

**Iniciar o continuar medicación  
para reducir hipertensión severa**

**Continuar monitoreo de  
la mujer y el feto**

si no hay convulsiones ni  
pérdida de consciencia



**Confirme edad gestacional**

Pre-viable

**en 24 horas**

**Interrumpa  
el embarazo**

**Continúe  $MgSO_4$   
por 24 horas después del  
nacimiento o desde la  
última convulsión**

**Continúe  
monitoreo**

Viable < 34 semanas



**Administre  
dexametasona**

**Hospitalice a la mujer  
y monitoree:**

- Convulsiones
- Hipertensión severa incontrolada
- Empeoramiento condición maternal (signos de alerta, evaluación, análisis de laboratorio)
- Empeoramiento del feto o muerte fetal
- El embarazo alcanza 37 semanas 0 días

$\geq 34$  semanas a  
< 37 semanas


> 37  
semanas

**en  
24 horas**

**Parto**

**Continúe  $MgSO_4$   
durante 24 horas después  
del parto o desde la última  
convulsión**

**Continúe  
medicación para  
reducir hipertensión  
severa**



**Provea cuidados  
esenciales a la mujer  
y al recién nacido**

**Continúe monitoreo  
después del parto**

**En  
4 horas**

**En  
12 horas**

Si a alguno