

Lorsque les
symptômes d'HTAP
vous font manquer des
activités
quotidiennes...

VIVEZ PLUS

de bonnes journées

AVEC ORÉNITRAM

Il a été prouvé que l'ajout d'orénitram retarde la progression de l'HTAP et peut aider à atténuer les symptômes, pour vous aider à en faire plus et à maîtriser votre HTAP.


orenitram[®]
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Qui ne devrait pas prendre de l'orénitram?

Ne prenez pas d'orénitram si vous avez de graves problèmes de foie.

Veillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté dans cette brochure ainsi que les renseignements posologiques complets et les renseignements pour le patient sur l'orénitram au www.orenitram.com.

HTAP = hypertension artérielle pulmonaire.

**L'HTAP peut vous priver des
bonnes journées que vous voulez
vivre...**

Est-il temps d'envisager l'ajout d'orénitram?

Les symptômes d'HTAP comme l'essoufflement ou la fatigue peuvent signifier que vous ne pouvez pas faire autant d'activités de votre vie quotidienne. Comme l'HTAP est une maladie évolutive, vous pourriez devenir moins actif au fil du temps.

Avec orénitram, vous pourriez être en mesure de faire plus de choses qui comptent pour vous

Vos médicaments actuels pour l'HTAP peuvent améliorer vos symptômes, mais vous devez savoir qu'il y a peut-être quelque chose de plus que vous pouvez faire.

Il a été prouvé que l'orénitram retarde la progression de l'HTAP et peut aider à atténuer les symptômes.

Il est maintenant temps de collaborer avec votre professionnel de la santé pour déterminer si orénitram vous convient.

Qu'est-ce que l'orénitram?

L'orénitram est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) qui est une tension artérielle élevée dans les artères de vos poumons. L'orénitram peut aider à ralentir la progression de votre maladie et à améliorer votre capacité à faire de l'exercice. On ignore si l'orénitram est sûr et efficace chez les enfants.

Ma distance de marche pendant 6 minutes ne s'améliorait pas. Mon médecin m'a recommandé de commencer à prendre orénitram pour m'aider à en faire plus physiquement et à me sentir mieux dans ma vie quotidienne.

— Angélie, une patiente prenant orénitram

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Que dois-je dire à mon professionnel de la santé avant de prendre orénitram?

Informez votre professionnel de la santé :

- Si vous avez des problèmes de foie ou une diverticulose de l'intestin.

Veillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté dans cette brochure ainsi que les renseignements posologiques complets et les renseignements pour le patient sur orénitram au www.orenitram.com.

Comment orénitram agit-il?

L'orénitram est un médicament oral qui agit différemment des autres médicaments oraux que vous prenez peut-être déjà pour l'HTAP. C'est pourquoi l'ajouter à votre plan de traitement pourrait être une nouvelle étape importante pour vous aider à en faire plus et à maîtriser votre HTAP.

L'HTAP affecte trois substances dans le corps

Les symptômes d'HTAP peuvent survenir lorsque les vaisseaux sanguins à l'intérieur de vos poumons rétrécissent, ce qui rend la circulation du sang plus difficile. On croit que ces changements sont causés par des déséquilibres de substances naturelles dans trois voies dans votre corps. Il existe des médicaments qui traitent chacune de ces trois voies.

OXYDE NITRIQUE

Selon la voie que vous traitez, vous pourriez peut-

ENDOTHÉLINE

PROSTACYCLINE

être en faire plus. **L'ajout d'orénitram pourrait aider à vous assurer de ne pas passer à côté du traitement de la voie de la prostacycline.**

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Que dois-je dire à mon professionnel de la santé avant de prendre orénitram? (suite)

Informez votre professionnel de la santé :

- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prévoyez tomber enceinte ou allaiter. On ne sait pas si orénitram nuira à votre enfant à naître ou si orénitram passe dans votre lait maternel. Discutez avec votre professionnel de la santé de la meilleure façon de nourrir votre bébé pendant le traitement par orénitram.

Pourquoi la voie de la prostacycline est-elle importante?

Lorsque vous souffrez d'HTAP, votre corps pourrait ne pas produire suffisamment de prostacycline, une substance naturelle qui maintient vos vaisseaux sanguins ouverts et assure le bon fonctionnement de ces derniers.



L'orénitram reproduit les effets de la prostacycline naturelle, ce qui aide à ouvrir les vaisseaux sanguins afin qu'il soit plus facile pour votre cœur de pomper le sang dans vos poumons.


orenitram
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

L'orénitram aide à remplacer la prostacycline naturelle dont vous pourriez manquer.

Parlez à votre professionnel de la santé pour savoir si orénitram peut vous aider à atteindre vos objectifs de traitement pour que vous puissiez commencer à *vivre plus de bonnes journées*.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Que dois-je dire à mon professionnel de la santé avant de prendre orénitram? (suite)

Informez votre professionnel de la santé :

- **À propos de tous les médicaments que vous prenez**, y compris les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les vitamines et les suppléments à base de plantes. L'orénitram et d'autres médicaments peuvent avoir des effets les uns sur les autres et causer des effets secondaires. Ne commencez pas à prendre tout nouveau médicament avant d'avoir consulté votre professionnel de la santé. Avisez particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez un autre médicament qui contient du tréprostinil, comme Remodulin® ou Tyvaso®.

Veillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté dans cette brochure ainsi que les renseignements posologiques complets et les renseignements pour le patient sur orénitram au www.orenitram.com.

Orénitram — vous aide à vivre plus de bonnes journées

L'orénitram est la forme en comprimés du même type de médicament éprouvé et digne de confiance qui est disponible comme traitement par pompe depuis plus de 18 ans. L'ajout d'orénitram peut vous aider à en faire plus et à contrôler votre HTAP.

Éprouvé pour retarder la progression de la maladie

Dans une étude clinique, les patients qui ont ajouté orénitram étaient...

**61 % MOINS
SUSCEPTIBLES**

**DE VOIR LEUR HTAP PROGRESSER AU FIL DU TEMPS
COMPARATIVEMENT À CEUX QUI NE PRENNENT PAS
D'ORÉNITRAM***

* Dans une étude clinique comprenant 690 patients qui prenaient tous un seul médicament oral pour l'HTAP (PDE-5i, sGCS ou ERA). Au début de l'étude, ces patients ont ajouté soit l'orénitram, soit un placebo à leur traitement.

† Dans une étude clinique comptant 349 patients ne prenant aucun traitement pour l'HTAP. Au début de l'étude, ces patients ont commencé à prendre soit l'orénitram, soit le placebo.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Comment dois-je prendre l'orénitram?

- **Ne modifiez pas votre dose et ne cessez pas soudainement de prendre l'orénitram sans en parler d'abord à votre professionnel de la santé.**

ERA = antagoniste des récepteurs de l'endothéline; PDE-5i = inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5; SGCS = activateur de la guanylate cyclase soluble.


Orénitram peut vous aider à en faire plus et à contrôler votre HTAP

Dans les études cliniques, l'ajout d'orénitram a aidé les patients à s'améliorer de plusieurs façons :


orenitram
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS




9 patients sur 10 ont amélioré ou maintenu leur capacité à effectuer plus d'activités quotidiennes avec moins de symptômes, comme mesuré par la classe fonctionnelle*



Diminution de l'effort demandé à leur cœur
; ce qui signifie que votre cœur n'a pas à travailler aussi fort pour pomper le sang vers vos poumons*

En aussi peu que **3 MOIS**



Diminution de l'essoufflement pendant les activités quotidiennes*



Augmentation de leur capacité à marcher plus loin, mesurée par un test de distance de marche pendant 6 minutes[†]

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Comment dois-je prendre l'orénitram? (suite)

- L'orénitram est habituellement pris 3 fois par jour (environ toutes les 8 heures) ou 2 fois par jour (environ toutes les 12 heures). Votre professionnel de la santé vous indiquera à quelle fréquence vous devez prendre l'orénitram. Si vous présentez des effets secondaires, votre professionnel de la santé pourrait vous demander de modifier votre dose ou le moment où vous prenez l'orénitram. Prenez l'orénitram avec de la nourriture.

Veillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté dans cette brochure ainsi que les renseignements posologiques complets et les

renseignements pour le patient sur orénitram au
www.orenitram.com.

L'orénitram pourrait aider à améliorer votre niveau de risque*

**9 PATIENTS
SUR 10 ONT
PRÉSENTÉ**

**UNE AMÉLIORATION OU
UNE STABILITÉ**

Les patients prenant de l'orénitram se sont améliorés ou ont maintenu leur niveau de risque, et une amélioration a été observée dès le troisième mois. En fait, plus de 30 % des patients se sont améliorés et ont été en mesure de maintenir une amélioration jusqu'à la semaine 60.

Pourquoi le niveau du risque est-il important?

Votre professionnel de la santé pourrait utiliser le niveau de risque pour prendre des décisions concernant votre traitement. Cela l'aide à déterminer comment vous allez aujourd'hui et à prédire comment vous irez à l'avenir.

Commencez la conversation

Vous trouverez un guide de discussion utile à la fin de cette brochure où il y a des questions que vous pouvez poser à votre professionnel de la santé au sujet de l'ajout d'orénitram à votre traitement. Remplissez-le et apportez-le à votre prochaine visite.

* Dans une étude clinique comprenant 690 patients qui prenaient tous un seul médicament oral pour l'HTAP (PDE-5i, sGCS ou ERA). Au début de l'étude, ces patients ont ajouté soit l'orénitram, soit un placebo à leur traitement.


orenitram[®]
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Comment dois-je prendre l'orénitram? (suite)

- Avalez les comprimés d'orénitram entiers. Ne pas couper, mâcher, écraser ou briser vos comprimés d'orénitram. Ne prenez pas les comprimés d'orénitram qui sont endommagés ou brisés. **Si les comprimés d'orénitram ne sont pas pris entiers, ils pourraient libérer trop de médicament en même temps. Cela peut entraîner des effets secondaires.**
- Si vous oubliez votre dose d'orénitram, prenez la dose oubliée dès que possible avec de la nourriture.

Avec orénitram, je peux faire plus de plans et créer plus de bons souvenirs. Je peux même partager les choses simples, comme cuisiner ou rire, avec ma famille et mes amis.

— Angelie, une patiente prenant orénitram

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Comment dois-je prendre l'orénitram? (suite)

- Si vous oubliez 2 doses ou plus d'orénitram, appelez votre professionnel de la santé pour savoir si vous devez modifier votre dose.
- Si vous prenez trop d'orénitram, appelez votre professionnel de la santé ou rendez-vous immédiatement au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Veillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté dans cette brochure ainsi que les

renseignements posologiques complets et les
renseignements pour le patient sur orénitram au
www.orenitram.com.

Commencer l'orénitram

Comme d'autres médicaments que vous pourriez prendre, orénitram est un comprimé oral. L'orénitram est pris avec de la nourriture, habituellement 3 fois par jour (toutes les 8 heures)*.



8 HEURES



8 HEURES



Votre professionnel de la santé vous dira exactement comment prendre l'orénitram et, ensemble, vous pourrez créer un plan qui convient à votre vie quotidienne.

Posologie personnalisée

Puisque l'HTAP est une maladie évolutive, vos besoins thérapeutiques peuvent changer au fil du temps. Avec orénitram, vous n'aurez peut-être pas à commencer à prendre un nouveau médicament. Votre professionnel de la santé peut continuer à augmenter ou à modifier votre dose pour répondre à vos besoins afin que vous puissiez continuer à prendre orénitram à long terme pour aider à maîtriser votre HTAP[†].

Orénitram est offert en comprimés à 5 concentrations, ce qui facilite l'ajustement de votre dose par votre professionnel de la santé.



Offert en comprimés à
5 concentrations

Non illustré à la taille réelle



orenitram
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

* L'orénitram peut également être pris 2 fois par jour (toutes les 12 heures). La concentration du comprimé peut être augmentée selon votre tolérance au traitement.

† Il n'y a pas de dose maximale d'orénitram, donc votre professionnel de la santé peut continuer à augmenter votre dose tant que vous êtes capable de tolérer le médicament.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Comment dois-je prendre l'orénitram? (suite)

- Vous pourriez voir l'enveloppe du comprimé dans vos selles (mouvements intestinaux). Cela est habituellement normal. L'enveloppe du comprimé n'est pas digérée. Si vous souffrez de diverticulose de l'intestin, l'enveloppe du comprimé pourrait rester coincée dans une cavité aveugle ou un diverticule dans votre intestin.

Savoir à quoi s'attendre du traitement

L'orénitram peut causer des effets secondaires. Les effets secondaires les plus courants associés à orénitram comprennent les maux de tête, la diarrhée, les nausées, les vomissements, les bouffées vasomotrices et la douleur dans les bras, les jambes et la mâchoire.

Votre professionnel de la santé vous parlera des effets secondaires possibles afin que vous puissiez vous sentir prêt et planifier à l'avance pour aider à les traiter.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Quels sont les effets secondaires possibles associés à l'orénitram?

L'orénitram peut causer des effets secondaires graves, y compris l'aggravation des symptômes d'HTAP.

- L'arrêt soudain de l'orénitram peut entraîner une aggravation de vos symptômes d'HTAP. Ne modifiez pas votre dose et ne cessez pas soudainement de prendre l'orénitram sans en parler d'abord à votre professionnel de la santé.

Veillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté dans cette brochure ainsi que les renseignements posologiques complets et les renseignements pour le patient sur orénitram au www.orenitram.com.

Soutien dès le début

Si vous et votre professionnel de la santé décidez que l'orénitram pourrait vous aider à atteindre vos objectifs thérapeutiques, United Therapeutics, le fabricant d'orénitram, fournit un soutien à chaque étape du processus.

Assistance d'une pharmacie spécialisée

Lorsque vous prenez orénitram, vous ne l'obtenez pas de votre pharmacie locale. United Therapeutics collabore avec les pharmacies spécialisées (PS) qui se spécialisent dans l'HTAP pour fournir votre médicament.

Votre PS vous aidera à chaque étape de votre traitement par orénitram, comme :

- Planification des visites du personnel infirmier pour commencer votre traitement
- Assistance continue offerte par l'entremise de visites en personne ou virtuelles, et un soutien téléphonique jour et nuit
- Organisation de la livraison de votre médicament



ASSIST est une équipe de United Therapeutics qui s'engage à vous aider avec votre ordonnance, qu'il s'agisse de répondre à des questions sur votre ordonnance, d'expliquer votre couverture d'assurance et bien plus encore. Pour en savoir plus, visitez www.orenitram.com.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Quels sont les effets secondaires possibles de l'orénitram? (suite)

- **Les effets secondaires les plus courants de l'orénitram comprennent** les maux de tête, la diarrhée, les nausées, les vomissements, les bouffées vasomotrices et la douleur dans les bras, les jambes et la mâchoire. Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles de l'orénitram. Prévenez votre professionnel de la santé si vous éprouvez tout effet secondaire dérangement ou si celui-ci ne se résorbe pas.

GUIDE DE DISCUSSION

Parlez de l'orénitram à votre professionnel de la santé



5 \$ PAR QUOTE-PART



Économies

Grâce à notre programme de quote-part, les patients admissibles peuvent payer aussi peu que 5 \$ par ordonnance pour l'orénitram*. Pour en savoir plus, visitez www.UTcopay.com.

Orenitram Connect

Pour en savoir plus sur l'ajout d'orénitram à votre plan de traitement pour l'HTAP, joignez-vous à Orenitram Connect. Grâce à ce programme, vous recevrez des info-lettres électroniques, des renseignements utiles et d'autres outils utiles. Inscrivez-vous au www.orenitram.com.

* POUR VOUS INSCRIRE À CE PROGRAMME, VOUS DEVEZ COMPRENDRE ET ACCEPTER DE RESPECTER LES EXIGENCES D'ADMISSIBILITÉ ET LES CONDITIONS D'UTILISATION.

Les critères d'admissibilité à ce programme sont les suivants :

Les patients doivent être âgés de 18 ans ou plus pour utiliser ce programme. Le programme n'est offert que pour les patients ayant une assurance commerciale (aussi connue sous le nom d'assurance privée) qui prennent le médicament pour une indication approuvée par la FDA. Les patients qui utilisent Medicare, Medicaid ou tout autre programme gouvernemental d'État ou fédéral pour payer leurs médicaments ne sont pas admissibles. Les patients qui commencent à bénéficier d'une couverture gouvernementale pendant la durée du programme ne seront plus admissibles. Les patients admissibles doivent être des résidents des États-Unis ou de Porto Rico.

Pour obtenir tous les détails et les modalités du programme, visitez www.UTcopay.com.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Quels sont les effets secondaires possibles de l'orénitram? (suite)

- Appelez votre professionnel de la santé pour obtenir des conseils médicaux au sujet des effets secondaires.

Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au www.fda.gov/MedWatch ou composer le 1 800 FDA-1088.

Veillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté dans cette brochure ainsi que les renseignements posologiques complets et les renseignements pour le patient sur orénitram au www.orenitram.com.



Vivez plus de bonnes journées avec orénitram

L'orénitram pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs thérapeutiques

- Il a été démontré que l'orénitram retarde la progression de l'HTAP et peut aider à atténuer les symptômes qui peuvent avoir un impact sur votre vie quotidienne
- La posologie personnalisée signifie que vous pouvez continuer à prendre orénitram à long terme pour aider à maîtriser votre HTAP*
- United Therapeutics offre du soutien tout au long de votre parcours thérapeutique avec orénitram

* Il n'y a pas de dose maximale d'orénitram; votre professionnel de la santé peut donc continuer à augmenter votre dose tant que vous êtes capable de tolérer le médicament.

Demandez à votre professionnel de la santé si l'ajout d'orénitram peut vous aider à en faire plus et à contrôler votre HTAP.

Pour en savoir plus sur orénitram, visitez www.orenitram.com.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ de l'orénitram

Les renseignements sur les risques fournis ici ne sont pas complets. Pour en savoir plus sur orénitram, parlez-en à votre professionnel de la santé. Veuillez consulter les renseignements posologiques complets et les renseignements pour le patient sur le site www.orenitram.com ou appeler le service à la clientèle au 1 877-UNITHER (1 877 864-8437).

OREISIconOCT19


orenitram[®]
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

Veillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté dans cette brochure ainsi que les renseignements posologiques complets et les renseignements pour le patient sur orénitram au www.orenitram.com.

Orénitram est une marque déposée de United Therapeutics Corporation.

© 2020 United Therapeutics Corporation. Tous droits réservés.

US/ORE/0722

GUIDE DE DISCUSSION

Parlez de l'orénitram à votre professionnel de la santé

Votre équipe soignante est votre meilleure source d'information sur vos options de traitement. Des discussions ouvertes et honnêtes avec eux au sujet de vos objectifs de traitement peuvent aider à déterminer si orénitram peut vous convenir. Vous trouverez ci-dessous certaines choses auxquelles réfléchir et des questions à poser au sujet de l'ajout d'orénitram à votre plan de traitement.

Tout d'abord, réfléchissez à savoir si vous tirez le maximum de votre traitement actuel et s'il pourrait être temps d'en faire plus pour vous aider à vous sentir mieux.

Remplissez ou notez vos objectifs de traitement et d'avenir (par exemple, prendre des vacances en famille ou être en mesure de faire plus de courses quotidiennes) :

Ensuite, posez les questions suivantes à votre professionnel de la santé et remplissez ou notez ses réponses :

Comment orénitram peut-il m'aider à atteindre mes objectifs de traitement?

Comment orénitram peut-il aider à atténuer mes symptômes?

En quoi orénitram diffère-t-il de mes médicaments actuels?

À quoi dois-je m'attendre du traitement?

Discutez avec votre professionnel de la santé pour savoir si orénitram vous convient.