

REMODULIN

CAR JE VEUX EN FAIRE PLUS

Vous aider à franchir l'étape suivante
avec le traitement par la pompe
Remodulin®

QU'EST-CE QUE REMODULIN?

Le Remodulin est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter les adultes atteints d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP; groupe 1 de l'OMS), qui est une tension artérielle élevée dans les artères de vos poumons. Le Remodulin peut réduire les symptômes associés à l'exercice. Le Remodulin a été étudié principalement chez des patients présentant des symptômes fonctionnels des classes II à IV de la NYHA. On ne sait pas si Remodulin est sûr et efficace chez les enfants.

Chez les personnes atteintes d'HTAP qui doivent cesser l'époprosténol, Remodulin est approuvé pour ralentir l'aggravation des symptômes.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ DU REMODULIN

Avant de prendre Remodulin, informez votre professionnel de la santé si vous :

- Souffrez d'autres affections médicales ou prenez d'autres médicaments qui pourraient influencer sur votre utilisation de Remodulin en augmentant le risque d'effets secondaires ou en diminuant l'efficacité du médicament.
- Avez des problèmes de foie ou de rein. Votre dose de Remodulin pourrait devoir être ajustée si vous avez des problèmes de foie.

Veuillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté aux pages 10 et 11, les renseignements posologiques complets et les renseignements pour le patient dans la pochette.

Que peut faire Remodulin pour vous?

Si vous et votre médecin ne voyez pas les améliorations que vous espérez concernant votre capacité d'exercice et les symptômes d'HTAP, il est peut-être temps d'envisager un traitement par prostacycline comme le Remodulin. En aussi peu que 3 mois, Remodulin peut vous aider à augmenter votre capacité d'exercice et à rester plus actif quotidiennement, afin que vous puissiez recommencer à faire les choses que vous aimez, avec les gens que vous aimez.

C'est une étape importante, mais vous aurez du soutien

L'idée de commencer un traitement par pompe avec Remodulin peut sembler intimidante au début, mais il s'agit d'une étape positive pour éventuellement faire plus de choses importantes pour vous, comme passer du temps avec votre famille ou faire vos courses quotidiennes.

Et n'oubliez pas, **vous n'êtes pas seul**. Vous aurez le soutien de vos professionnels de la santé, de la pharmacie spécialisée, de vos amis et de votre famille, et d'autres personnes, comme vous, qui sont touchées par l'HTAP. Vous aurez également accès à des programmes de soutien de United Therapeutics, une entreprise dédiée à fournir des traitements et des options d'administration novatrices pour rendre plus facile de vivre avec l'HTAP.

Parce que vous voulez en faire plus

Apprenez-en autant que possible. Lorsque vous avez des rendez-vous avec votre médecin, apportez un bloc-notes et demandez à quelqu'un de vous accompagner pour prendre des notes et vous aider avec tous les renseignements.

—Un patient qui prend Remodulin

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ DU REMODULIN (SUITE)

Avant de prendre Remodulin, informez votre professionnel de la santé si vous :

- Avez une faible tension artérielle ou des problèmes de saignement.
- Prenez du gemfibrozil (pour le cholestérol élevé), de la rifampine (pour une infection) ou d'autres médicaments qui touchent les enzymes du foie. Votre médecin pourrait devoir ajuster votre dose de Remodulin.

Veillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté aux pages 10 et 11, les renseignements posologiques complets et les renseignements pour le patient dans la pochette.


HTAP = hypertension artérielle pulmonaire.

Remodulin – l'expérience pour aider les personnes atteintes d'HTAP

LE PLUS PRESCRIT


En tant que traitement par pompe le plus prescrit pour l'HTAP aux États-Unis, Remodulin est utilisé depuis 2002 par des milliers de personnes atteintes d'HTAP.

Mode d'action de Remodulin



Vaisseau avec HTAP

En présence d'HTAP, le corps ne produit pas suffisamment de prostacycline, une substance naturelle qui maintient vos vaisseaux sanguins ouverts et assure le bon fonctionnement de ces derniers.



Vaisseau avec traitement par Remodulin

Le Remodulin agit comme la prostacycline naturelle dans votre corps pour aider à garder les vaisseaux sanguins ouverts dans vos poumons.

Vous aider à être plus actif

Le Remodulin rend plus facile pour votre cœur de pomper le sang dans vos poumons en fournissant la prostacycline dont votre corps a besoin tout au long de la journée.

Le Remodulin peut atténuer vos symptômes d'HTAP, comme l'essoufflement et la fatigue, et améliorer certains facteurs utilisés pour évaluer le risque d'aggravation de votre maladie.

Visitez Remodulin.com pour obtenir davantage de renseignements sur ce que l'on vit en prenant Remodulin.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ DU REMODULIN (SUITE)

Avant de prendre Remodulin, informez votre professionnel de la santé si vous :

- Êtes enceinte, allaitez ou prévoyez devenir enceinte. On ne sait pas si Remodulin nuira votre enfant à naître ou si Remodulin passe dans le lait maternel.

Quels sont les effets secondaires graves de Remodulin?

- Les perfusions intraveineuses (i.v.) en continu de Remodulin administrées à l'aide d'une pompe à perfusion externe, avec un tube placé dans une veine centrale dans la poitrine, sont associées à un risque d'infections de la circulation sanguine et de septicémie, ce qui peut être fatal. Par conséquent, la perfusion sous-cutanée (SC) en continu administrée juste sous la peau est le type d'administration privilégié.

**REMODULIN[®]**
(treprostinil) Injection
Experience • Innovation • Support

Options de pompes conçues en pensant à vous

Le Remodulin est administré par un système de pompe, semblable à ceux utilisés par les personnes diabétiques. Avec Remodulin, vous recevez le médicament en permanence, jour et nuit, 7 jours sur 7, vous êtes ainsi assuré de recevoir le médicament dont vous avez besoin en tout temps. Et United Therapeutics continue de mettre au point des options de pompe pour simplifier l'administration de Remodulin.

L'administration de Remodulin peut demander un certain temps d'adaptation, mais faites les choses une étape à la fois et fiez-vous au soutien offert par le personnel infirmier de la pharmacie spécialisée et votre équipe de soins de santé. Ensemble, vous trouverez un moyen d'intégrer Remodulin à votre routine quotidienne et votre mode de vie.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ DU REMODULIN (SUITE)

Quels sont les effets secondaires graves de Remodulin?

- Aggravation des symptômes d'HTAP. Ne cessez pas de prendre Remodulin ou ne réduisez pas de façon importante votre dose sans d'abord consulter votre médecin.
- Faible tension artérielle (hypotension symptomatique). Si vous présentez une faible tension artérielle ou si vous prenez des médicaments qui abaissent votre tension artérielle, le risque d'une faible tension artérielle est accru.

Veillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté aux pages 10 et 11, les renseignements posologiques complets et les renseignements pour le patient dans la pochette.

Remodulin sous-cutané (SC)

Le Remodulin SC est administré dans le corps par un tube très mince (canule) inséré tout juste sous la peau.

Quels sont les avantages de Remodulin SC pour vous :

- Options de petites pompes discrètes (plus petites que les pompes à perfusion IV)
- Aucune intervention chirurgicale nécessaire
- Moins de risques d'infections de la circulation sanguine que l'administration par IV
- Facilité d'usage accrue – le médicament n'a pas besoin d'être mélangé à la maison
- La plupart des pompes SC doivent être remplies tous les 2 à 3 jours

La voie SC est la façon privilégiée de prendre Remodulin en raison de la diminution du risque d'infections de la circulation sanguine.

Pompe SC disponible

Remunity®

La pompe Remunity pour Remodulin a été spécialement conçue en pensant à vous. Diamètre de seulement 5 cm (2 po), épaisseur de 2 cm (3/4 po) et poids de seulement 28 g (1,7 oz), Remunity offre une option plus discrète pour l'administration par voie SC.

D'autres pompes SC peuvent également être disponibles et vous pouvez en discuter avec votre pharmacie spécialisée.

Options de remplissage diverses pour s'adapter à votre mode de vie

Grâce à Remunity, les cassettes peuvent être remplies à domicile par vous ou votre aidant, ou préremplies par votre pharmacie spécialisée et livrées directement à votre domicile.

Pour en savoir plus sur la pompe Remunity, visitez Remunity.com.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ POUR REMUNITY

Mises en garde et précautions

Ne pas utiliser le système en dehors des conditions énumérées dans le Guide de l'utilisateur. Conservez le Guide de l'utilisateur pour consultation ultérieure. Consulter le Guide de l'utilisateur pour connaître toutes les mises en garde et précautions. Le non-respect de ces mises en garde et précautions suivantes peut entraîner des blessures.

Utilisation limitée à Remodulin. Seules les cassettes Remunity peuvent être utilisées avec la pompe Remunity. La pompe Remunity ne doit être utilisée qu'avec des dispositifs de perfusion approuvés par la FDA : Dispositif de perfusion Medtronic Quick-set (MMT-392, MMT-393), dispositif de perfusion Medtronic Silhouette (MMT-373) et dispositif de perfusion Smiths Medical Cleo 90 (21-7230-24, 21-7220-24).

IV = intraveineuse.



REMODULIN
(treprostiril) Injection
Experience • Innovation • Support

Parlez-en à votre médecin

Assurez-vous de discuter de vos objectifs de traitement avec votre médecin. Ensemble, vous pouvez discuter des avantages et des risques de chaque option d'administration afin de déterminer la meilleure voie d'administration et la meilleure pompe pour vous.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ DU REMODULIN (SUITE)

Quels sont les effets secondaires graves de Remodulin?

- Problèmes de saignement. Le Remodulin peut augmenter le risque de saignement chez les personnes qui prennent des anticoagulants.

Quels sont les effets secondaires possibles de Remodulin?

- Dans le cadre d'études cliniques sur la perfusion SC de Remodulin, la plupart des personnes ont présenté une douleur au point de perfusion et une réaction au point de perfusion (rougeur, enflure et éruption cutanée). Ces symptômes étaient parfois graves et ont parfois nécessité un traitement par des narcotiques ou l'interruption de Remodulin.

Veillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté aux pages 10 et 11, les renseignements posologiques complets et les renseignements pour le patient dans la pochette.

Remodulin intraveineux (IV)

Le Remodulin IV est administré directement dans la circulation sanguine par un tube étroit et flexible appelé cathéter, qui est placé dans une veine de la partie supérieure de votre poitrine. La procédure peut nécessiter un séjour d'une nuit à l'hôpital.

Comment le Remodulin IV vous est bénéfique :

- Le médicament est préparé par vous-même à la maison ou par la pharmacie spécialisée qui vous enverra directement des cassettes prémélangées.
- Le réservoir de la pompe est généralement rempli tous les 2 jours
- Aucune douleur généralement observée au point de perfusion
- Aucun bloc réfrigérant nécessaire pour l'administration

Un membre du personnel infirmier de la pharmacie spécialisée sera là pour vous soutenir afin que vous soyez confiant de commencer le traitement par pompe avec Remodulin IV. Votre équipe de soins de santé peut également aider à inscrire des patients admissibles* à un programme de préparation prémélangée pour économiser du temps et d'éviter toute erreur éventuelle lors du mélange du médicament.

Pompe disponible

CADD[®]-Solis

- Une pompe IV fiable et durable
- 10 cm x 12 cm x 2,5 cm (4 po x 5 po x 1,6 po) (excluant la cassette ou d'autres accessoires)

D'autres pompes IV peuvent également être disponibles et vous pouvez en discuter avec votre pharmacie spécialisée.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ DU REMODULIN (SUITE)

Quels sont les effets secondaires possibles de Remodulin?

- La perfusion IV de Remodulin administrée à l'aide d'une pompe externe a été associée à un risque d'infections de la circulation sanguine, d'enflure des bras, de picotements, de bleus et de douleur.
- Les effets secondaires les plus fréquemment observés avec Remodulin SC ou IV étaient maux de tête, diarrhée, nausées, éruption cutanée, douleur à la mâchoire, élargissement des vaisseaux sanguins (vasodilatation) et enflure causée par la rétention de liquide (œdème). Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles de Remodulin.

Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux au sujet des effets secondaires.

* Le programme SPmix est destiné aux patients qui prennent une dose constante de Remodulin depuis au moins un mois et qui font le mélange eux-mêmes depuis au moins 3 mois.

Commencer le Remodulin

Lorsque vous commencez le traitement, vous serez entouré d'une équipe qui peut vous offrir du soutien à chaque étape du processus, aider à s'assurer qu'on répond à vos questions et vous aider à vous sentir en confiance dans la poursuite de votre traitement par Remodulin.



1 : Remplir le formulaire de demande

Votre équipe de soins de santé commencera le processus d'initiation du traitement en remplissant et en soumettant votre formulaire de demande à un fournisseur de pharmacie spécialisé.



2 : Vérifier la couverture d'assurance

La pharmacie spécialisée ou le bureau de votre médecin communiquera avec votre compagnie d'assurance pour aider à déterminer et à vérifier votre couverture. Ils peuvent déterminer si vous êtes admissible au Programme d'assistance à quote-part.

CONSEIL : Votre compagnie d'assurance ou votre pharmacie spécialisée communiquera avec vous pour discuter de votre couverture, alors assurez-vous de répondre au téléphone.



3 : Commencez votre traitement par Remodulin

Vous serez mis en communication avec un membre dédié du personnel infirmier de la pharmacie spécialisée qui peut vous fournir du soutien et de l'éducation, ainsi qu'une formation à domicile sur la façon de préparer votre médicament et d'utiliser votre pompe. L'infirmier(ère) viendra autant de fois que nécessaire pour vous aider à vous sentir à l'aise avec votre traitement.



4 : Expédition des fournitures en temps opportun

La pharmacie spécialisée s'occupera de coordonner la livraison de vos médicaments et de vos fournitures. Ils vous enverront des renouvellements et des fournitures selon un horaire régulier pour que les ayez toujours lorsque vous en avez besoin.



5 : Faire appel aux services de soutien

Vous pouvez accéder à plusieurs ressources et programmes de soutien par l'entremise de United Therapeutics, comme le programme de soutien Remodulin, les réseaux sociaux (Facebook et YouTube), et plus encore.

Faciliter le traitement grâce aux programmes de soutien offerts par United Therapeutics



Programme d'assistance avec quote-part

United Therapeutics offre une aide financière pour vous aider à payer vos quotes-parts pour le traitement par Remodulin. Dans le cadre de ce programme d'assistance avec quote-part, la plupart des patients admissibles* qui s'inscrivent paient aussi peu qu'une quote-part de 0 \$ par ordonnance, jusqu'à concurrence de 8000 \$ d'économies par année.

Les renseignements pour l'inscription sont disponibles au www.UTcopy.com ou en appelant ASSIST au 1 877 864-8437.



ADJOINT

D'autres options d'aide financière peuvent être offertes si vous n'êtes pas admissible à ce programme. Communiquez avec ASSIST pour obtenir de plus amples renseignements. ASSIST est disponible du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h HE. Votre équipe d'accès aux solutions et au soutien, ou votre conseiller ASSIST, vous aidera à déterminer si vous êtes admissible à l'aide financière.



Programme de soutien pour Remodulin

United Therapeutics a créé un programme pour soutenir les personnes prenant Remodulin. Lorsque vous vous inscrivez, vous recevrez une série de courriels conçus pour vous fournir des renseignements et des conseils importants, à tout moment de votre parcours de traitement.

Numérisez le code QR ici ou visitez Remodulin.com pour vous inscrire.



Mon Remodulin : Renseignements sur le traitement personnalisé

Le portail en ligne Mon Remodulin est accessible à tous les nouveaux patients qui commencent leur traitement par Remodulin et est conçu pour fournir des ressources éducatives et de soutien utiles lorsque vous commencez et poursuivez le traitement.

Grâce à Mon Remodulin, vous pouvez accéder à des renseignements utiles sur votre pompe et votre traitement, tous adaptés spécifiquement à vos besoins et à ceux de votre traitement.

- Vous devez être âgé de 18 ans ou plus.
- Le programme n'est offert que pour les patients ayant une assurance commerciale (aussi connue sous le nom d'assurance privée) qui prennent le médicament pour une indication approuvée par la FDA.
- Les patients qui utilisent Medicare, Medicaid ou tout autre programme gouvernemental d'État ou fédéral pour payer leurs médicaments ne sont pas admissibles. Les patients qui commencent à bénéficier d'une couverture gouvernementale pendant la durée du programme ne seront plus admissibles.
- Les patients admissibles doivent être des résidents des États-Unis ou de Porto Rico.

Le programme est assujéti à d'autres restrictions de la loi de l'État. Les patients résidant dans certains États pourraient ne pas être admissibles au programme. Nul là où interdit, taxé ou limité par la loi.

D'autres modalités s'appliquent. Veuillez consulter le site www.UTcopy.com.



INDICATION pour la pompe Remunity® pour injection de Remodulin® (tréprostini)

La pompe Remunity pour injection de Remodulin (tréprostini) est destinée à l'administration sous-cutanée continue par injection de Remodulin (tréprostini) chez les adultes (âgé de plus de 22 ans).

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ POUR REMUNITY

Mises en garde et précautions

Ne pas utiliser le système en dehors des conditions énumérées dans le Guide de l'utilisateur. Conservez le Guide de l'utilisateur pour consultation ultérieure. Consulter le Guide de l'utilisateur pour connaître toutes les mises en garde et précautions. Le non-respect de ces mises en garde et précautions suivantes peut entraîner des blessures.

Utilisation limitée à Remodulin. Seules les cassettes Remunity peuvent être utilisées avec la pompe Remunity. La pompe Remunity ne doit être utilisée qu'avec des dispositifs de perfusion approuvés par la FDA : Dispositif de perfusion Medtronic Quick-set (MMT-392, MMT-393), dispositif de perfusion Medtronic Silhouette (MMT-373) et dispositif de perfusion Smiths Medical Cleo 90 (21-7230-24, 21-7220-24).

Ne pas utiliser de produits jetables d'un emballage stérile déjà ouvert ou endommagé, de composants jetables endommagés ou de composants stériles périmés. Cessez d'utiliser la télécommande et passez à la télécommande de rechange si la télécommande ne fonctionne pas. L'utilisation de câbles, de batteries et de chargeurs de batteries autres que ceux fournis ou spécifiés, peut entraîner une augmentation des émissions ou une diminution de l'immunité du système de perfusion de la pompe Remunity. Ne débranchez pas la pompe de la cassette lorsque la cassette est connectée au cathéter. Évitez d'exposer votre pompe et votre cassette à des températures inférieures à 5 °C (41 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F). La pompe peut affecter les appareils électriques et électroniques à proximité, y compris les appareils médicaux, les téléphones cellulaires, les appareils Bluetooth, les lecteurs à RFID, les appareils Wi-Fi et les champs magnétiques puissants, faisant en sorte que ces appareils fonctionnent anormalement ou cessent de fonctionner. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à une température supérieure à 60 °C (140 °F) ou incinérer la batterie ou la télécommande de la pompe, car cela pourrait entraîner un incendie ou une propagation rapide du feu pouvant causer des blessures. Ce système prend en charge des débits compris entre 16 µL/h et 225 µL/h. Si votre débit est hors de cette plage, discutez-en avec votre professionnel de la santé.

Renseignements sur l'ordonnance

Mise en garde : La loi fédérale (É.-U.) restreint la vente de ce dispositif que par des professionnels de la santé autorisés ou sur ordonnance de ces derniers. L'utilisation de ce dispositif sans la formation et la supervision d'un professionnel de la santé peut entraîner des erreurs dont découlent des blessures.

REMUISIconOCT2022

Consulter le Guide de l'utilisateur de la pompe à perfusion Remunity pour l'injection de Remodulin (tréprostini) pour obtenir des renseignements détaillés importants sur la sécurité, y compris des mises en garde, des précautions et des instructions sur la façon d'utiliser correctement le système.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec United Therapeutics Corp. au 1 877 864-8437.

La pompe Remunity pour injection de le Remodulin (tréprostini) est fabriquée pour United Therapeutics Corp.

Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au www.fda.gov/MedWatch ou appelez le 1 800 FDA-1088.

Remodulin® (tréprostinil) injectable

INDICATION OU QU'EST-CE QUE LE REMODULIN?

Le Remodulin est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter les adultes atteints d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP; groupe 1 de l'OMS), qui est une tension artérielle élevée dans les artères de vos poumons. Le Remodulin peut réduire les symptômes associés à l'exercice. Le Remodulin a été étudié principalement chez des patients présentant des symptômes fonctionnels des classes II à IV de la NYHA. On ne sait pas si Remodulin est sûr et efficace chez les enfants.

Chez les personnes atteintes d'HTAP qui doivent cesser l'époprosténol, Remodulin est approuvé pour ralentir l'aggravation des symptômes.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ DU REMODULIN

Avant de prendre Remodulin, informez votre professionnel de la santé si vous :

- Souffrez d'autres affections médicales ou prenez d'autres médicaments qui pourraient influencer sur votre utilisation de Remodulin en augmentant le risque d'effets secondaires ou en diminuant l'efficacité du médicament.
- Avez des problèmes de foie ou de rein. Votre dose de Remodulin pourrait devoir être ajustée si vous avez des problèmes de foie.
- Avez une faible tension artérielle ou des problèmes de saignement.
- Prenez du gemfibrozil (pour le cholestérol élevé), de la rifampine (pour une infection) ou d'autres médicaments qui touchent les enzymes du foie. Votre médecin pourrait devoir ajuster votre dose de Remodulin.
- Êtes enceinte, allaitez ou prévoyez devenir enceinte. On ne sait pas si Remodulin nuira votre enfant à naître ou si Remodulin passe dans le lait maternel.

Quels sont les effets secondaires graves de Remodulin?

- Les perfusions intraveineuses (i.v.) en continu de Remodulin administrées à l'aide d'une pompe à perfusion externe, avec un tube placé dans une veine centrale dans la poitrine, sont associées à un risque d'infections de la circulation sanguine et de septicémie, ce qui peut être fatal. Par conséquent, la perfusion sous-cutanée (SC) en continu administrée juste sous la peau est le type d'administration privilégié.
- Aggravation des symptômes d'HTAP. Ne cessez pas de prendre Remodulin ou ne réduisez pas de façon importante votre dose sans d'abord consulter votre médecin.
- Faible tension artérielle (hypotension symptomatique). Si vous présentez une faible tension artérielle ou si vous prenez des médicaments qui abaissent votre tension artérielle, le risque d'une faible tension artérielle est accru.
- Problèmes de saignement. Le Remodulin peut augmenter le risque de saignement chez les personnes qui prennent des anticoagulants.

Quels sont les effets secondaires possibles de Remodulin?

- Dans le cadre d'études cliniques sur la perfusion SC de Remodulin, la plupart des personnes ont présenté une douleur au point de perfusion et une réaction au point de perfusion (rougeur, enflure et éruption cutanée). Ces symptômes étaient parfois graves et ont parfois nécessité un traitement par des narcotiques ou l'interruption de Remodulin.
- La perfusion IV de Remodulin administrée à l'aide d'une pompe externe a été associée à un risque d'infections de la circulation sanguine, d'enflure des bras, de picotements, de bleus et de douleur.
- Les effets secondaires les plus fréquemment observés avec Remodulin SC ou IV étaient maux de tête, diarrhée, nausées, éruption cutanée, douleur à la mâchoire, élargissement des vaisseaux sanguins (vasodilatation) et enflure causée par la rétention de liquide (œdème). Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles de Remodulin. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux au sujet des effets secondaires.

Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au www.fda.gov/MedWatch ou appelez le 1 800 FDA-1088.

Les renseignements sur les risques fournis ici ne sont pas complets. Pour en savoir plus sur Remodulin, parlez-en à votre professionnel de la santé. **Veillez consulter les renseignements posologiques complets au www.remodulin.com ou appeler le service à la clientèle au 1 877-UNITHER (1 877 864-8437).**

REMISIconMAY2021



Parce que vous voulez en faire plus

En tant que traitement par pompe le plus prescrit pour l'HTAP, Remodulin permet aux personnes comme vous de progresser avec un traitement vous aidant à rester actif dans votre vie quotidienne.

- ✓ Éprouvé pour vous aider à vous sentir mieux et à mieux fonctionner
- ✓ Un choix d'options de pompes qui peuvent répondre à vos besoins personnels
- ✓ Soutien disponible qui peut vous aider à commencer et à continuer le traitement

N'oubliez pas, de nombreuses personnes ont intégré Remodulin avec succès dans leur vie quotidienne, **et nous sommes confiants que vous pouvez aussi le faire.**

Visitez le site **Remodulin.com** pour en savoir plus sur la vie avec l'HTAP et Remodulin, sur de vrais patients qui suivent un traitement et pour vous inscrire à du soutien supplémentaire.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÛRETÉ DU REMODULIN (SUITE)

Quels sont les effets secondaires possibles de Remodulin?

- Dans le cadre d'études cliniques sur la perfusion SC de Remodulin, la plupart des personnes ont présenté une douleur au point de perfusion et une réaction au point de perfusion (rougeur, enflure et éruption cutanée). Ces symptômes étaient parfois graves et ont parfois nécessité un traitement par des narcotiques ou l'interruption de Remodulin.
- La perfusion IV de Remodulin administrée à l'aide d'une pompe externe a été associée à un risque d'infections de la circulation sanguine, d'enflure des bras, de picotements, de bleus et de douleur.
- Les effets secondaires les plus fréquemment observés avec Remodulin SC ou IV étaient maux de tête, diarrhée, nausées, éruption cutanée, douleur à la mâchoire, élargissement des vaisseaux sanguins (vasodilatation) et enflure causée par la rétention de liquide (œdème). Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles de Remodulin. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux au sujet des effets secondaires.

Veuillez consulter l'ensemble des renseignements importants sur la sûreté aux pages 10 et 11, les renseignements posologiques complets et les renseignements pour le patient dans la pochette.

**REMODULIN**[®]
(treprostinil) Injection
Experience • Innovation • Support