

**Khi các triệu chứng
PAH khiến bạn bỏ
lỡ các hoạt động
hằng ngày...**

NẮM BẮT THÊM

những ngày tốt lành

VỚI ORENITRAM

**Việc bổ sung Orenitram đã được chứng minh là làm chậm sự
tiến triển của PAH và có thể giúp cải thiện các triệu chứng—để
giúp bạn làm được nhiều hơn và giúp kiểm soát PAH của bạn**

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram

Ai không nên dùng Orenitram?

Không dùng Orenitram nếu bạn có các vấn đề nặng ở gan.


orenitram[®]
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng toàn chỉnh trong tài liệu này và Thông tin kê đơn đầy đủ và Thông tin dành cho bệnh nhân cho Orenitram tại www.orenitram.com.

PAH=tăng áp động mạch phổi.

PAH có thể khiến bạn bỏ lỡ những ngày tốt lành mà bạn muốn nắm bắt...

Đã đến lúc cân nhắc bổ sung Orenitram chưa?

Các triệu chứng PAH như thở gấp hoặc cảm thấy mệt mỏi có thể có nghĩa là bạn không thể thực hiện nhiều hoạt động trong cuộc sống hằng ngày. Vì PAH là một bệnh tiến triển, bạn có thể thấy mình trở nên kém năng động hơn theo thời gian.

Với Orenitram, bạn có thể làm được nhiều điều quan trọng đối với bạn hơn

Thuốc điều trị PAH hiện tại của bạn có thể giúp ích cho các triệu chứng của bạn, nhưng bạn nên biết rằng bạn có thể làm được nhiều hơn.

Orenitram đã được chứng minh là làm chậm sự tiến triển của PAH và có thể giúp cải thiện các triệu chứng.

Bây giờ là lúc để làm việc với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn để xác định xem Orenitram có phù hợp với bạn hay không.

Orenitram là gì?

Orenitram là một loại thuốc kê đơn được sử dụng để điều trị tăng áp động mạch

phổi (PAH) là tình trạng huyết áp cao trong động mạch phổi của bạn. Orenitram có thể giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh và cải thiện khả năng tập luyện của bạn. Vẫn chưa biết liệu Orenitram có an toàn và hiệu quả ở trẻ em hay không.

Khoảng cách đi bộ 6 phút của tôi không cải thiện. Bác sĩ khuyên tôi nên bắt đầu dùng Orenitram để giúp tôi hoạt động thể chất được nhiều hơn và cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày.

— Angelie, một bệnh nhân dùng Orenitram


orenitram®
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram

Tôi nên nói gì với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình trước khi dùng Orenitram?

Hãy cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn biết:

- Nếu bạn có vấn đề về gan hoặc viêm túi thừa.

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng hoàn chỉnh trong tài liệu này và Thông tin kê đơn đầy đủ và Thông tin dành cho bệnh nhân cho Orenitram tại www.orenitram.com.

Orenitram hoạt động như thế nào?

Orenitram là một loại thuốc uống hoạt động theo cách khác với các loại thuốc uống khác mà bạn có thể đã dùng để điều trị PAH. Đó là lý do tại sao việc bổ sung thuốc này vào kế hoạch điều trị của bạn có thể là bước quan trọng tiếp theo để giúp bạn làm được nhiều hơn và giúp kiểm soát PAH của bạn.

PAH ảnh hưởng đến 3 chất trong cơ thể

Các triệu chứng PAH có thể xảy ra khi các mạch máu bên trong phổi của bạn bị hẹp lại, khiến máu khó chảy hơn. Những thay đổi này được cho là do sự mất cân bằng của các chất tự nhiên trong 3 con đường trong cơ thể bạn. Có những loại thuốc điều trị từng con đường trong số 3 con đường đó.

NITRIC OXIDE

ENDOTHELIN

PROSTACYCLIN

Tùy thuộc vào con đường mà bạn điều trị, bạn có thể làm được nhiều điều hơn. **Bổ sung Orenitram có thể giúp đảm bảo bạn không bỏ lỡ việc điều trị con đường prostacyclin.**

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram


Tôi nên nói gì với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình trước khi dùng Orenitram? (tiếp)

Hãy cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn biết:

- Nếu bạn đang mang thai, đang cho con bú và/hoặc có kế hoạch mang thai hoặc cho con bú. Không biết liệu Orenitram có gây hại cho thai nhi hay không hoặc liệu Orenitram có đi vào sữa của bạn hay không. Hãy trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn về cách tốt nhất để nuôi con trong quá trình điều trị bằng Orenitram.

Tại sao con đường prostacyclin lại quan trọng?

Khi bạn bị PAH, cơ thể bạn có thể không sản xuất đủ prostacyclin, một chất tự nhiên giúp mạch máu của bạn mở và hoạt động bình thường.



Orenitram mô phỏng tác dụng của prostacyclin tự nhiên, giúp mở các mạch máu để tim dễ dàng bơm máu qua phổi hơn.



orenitram[®]
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

Orenitram giúp thay thế prostacyclin tự nhiên mà bạn có thể bị thiếu.

Hãy trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn để xem liệu Orenitram có thể giúp bạn đạt được mục tiêu điều trị của mình hay không để bạn có thể bắt đầu *nắm bắt nhiều ngày tươi đẹp hơn*.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram

Tôi nên nói gì với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình trước khi dùng Orenitram? (tiếp)

Hãy cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn biết:

- **Về tất cả các loại thuốc bạn dùng**, bao gồm thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn, vitamin và thuốc bổ thảo dược. Orenitram và các thuốc khác có thể ảnh hưởng đến nhau gây ra tác dụng phụ. Không bắt đầu dùng bất kỳ loại thuốc mới nào cho đến khi bạn kiểm tra với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình. Đặc biệt, hãy cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn biết nếu bạn dùng một loại thuốc khác có chứa treprostinil, chẳng hạn như Remodulin® hoặc Tyvaso®.

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng hoàn chỉnh trong tài liệu này và Thông tin kê đơn đầy đủ và Thông tin dành cho bệnh nhân cho Orenitram tại www.orenitram.com.

Orenitram—giúp bạn nắm bắt nhiều ngày tươi đẹp hơn

Orenitram là dạng viên nén chứa cùng một loại thuốc đã được chứng minh và đáng tin cậy đã được sử dụng làm liệu pháp bơm trong hơn 18 năm. Bổ sung Orenitram có thể giúp bạn làm được nhiều hơn và giúp kiểm soát PAH của bạn.

Đã được chứng minh là làm chậm tiến triển bệnh

Trong một nghiên cứu lâm sàng, những bệnh nhân bổ sung Orenitram...

GIẢM 61% NGUY CƠ

**TIẾN TRIỂN PAH THEO THỜI GIAN SO VỚI
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG DÙNG ORENITRAM***

*Trong một nghiên cứu lâm sàng bao gồm 690 bệnh nhân đều đang uống một loại thuốc điều trị PAH duy nhất (PDE-5i, sGCS hoặc ERA). Khi bắt đầu nghiên cứu, những bệnh nhân này đã bổ sung Orenitram hoặc giả dược vào phương pháp điều trị của họ.

†Trong một nghiên cứu lâm sàng bao gồm 349 bệnh nhân không dùng bất kỳ liệu pháp PAH nào. Khi bắt đầu nghiên cứu, những bệnh nhân này bắt đầu dùng Orenitram hoặc giả dược.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram

Tôi nên dùng Orenitram như thế nào?

- Không được thay đổi liều hoặc đột ngột ngưng dùng Orenitram mà không trao đổi trước với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.

ERA=thuốc đối kháng thụ thể endothelin; PDE-5i=thuốc ức chế phosphodiesterase loại 5; sGCS=thuốc kích thích guanylate cyclase hòa tan.


Orenitram có thể giúp bạn làm được nhiều hơn và giúp kiểm soát PAH của bạn

Trong các nghiên cứu lâm sàng, bổ sung Orenitram đã giúp bệnh nhân cải thiện theo một số cách:






9 trong số 10 bệnh nhân cải thiện hoặc duy trì khả năng thực hiện nhiều hoạt động hằng ngày hơn với ít triệu chứng hơn, được đo bằng phân loại chức năng*



Giảm căng thẳng cho tim của họ

—có nghĩa là tim của bạn không phải làm việc chăm chỉ để bơm máu đến phổi*

Trong ít nhất **3 THÁNG**



Giảm thờ gáp trong các hoạt động hằng ngày*



Tăng khả năng đi bộ xa hơn, được đo bằng phép thử khoảng cách đi bộ 6 phút†

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram

Tôi nên dùng Orenitram như thế nào? (tiếp)

- Orenitram thường được dùng 3 lần mỗi ngày (khoảng 8 giờ một lần) hoặc 2 lần mỗi ngày (khoảng 12 giờ một lần). Chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ cho biết bao lâu thì bạn nên dùng Orenitram một lần. Nếu bạn gặp tác dụng phụ, chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể yêu cầu bạn thay đổi liều hoặc thời điểm dùng Orenitram. Dùng Orenitram với thức ăn.

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng hoàn chỉnh trong tài liệu này và Thông tin kê đơn đầy đủ và Thông tin dành cho bệnh nhân cho Orenitram tại www.orenitram.com.

Orenitram có thể giúp

cải thiện trạng thái nguy cơ của bạn*

9 TRONG SỐ 10 ĐÃ THIÊN HOẠC DUY TRÌ

Các bệnh nhân dùng Orenitram đã cải thiện hoặc duy trì trạng thái nguy cơ của họ—và sự cải thiện được quan sát thấy sớm nhất là sau 3 tháng. Trên thực tế, hơn 30% bệnh nhân đã cải thiện và có thể duy trì sự cải thiện cho đến tuần 60.

Tại sao trạng thái nguy cơ lại quan trọng?

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng trạng thái nguy cơ để đưa ra quyết định về việc điều trị cho bạn. Đây là yếu tố giúp xác định tình trạng hiện tại và dự đoán tình trạng tương lai của bạn.

Bắt đầu cuộc trò chuyện

Hãy tìm hướng dẫn thảo luận hữu ích ở cuối tài liệu này, với các câu hỏi bạn có thể hỏi chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình về việc bổ sung Orenitram vào phương pháp điều trị của bạn. Điền thông tin và mang theo đến lần khám tiếp theo.

*Trong một nghiên cứu lâm sàng bao gồm 690 bệnh nhân đều đang uống một loại thuốc điều trị PAH duy nhất (PDE-5i, sGCS hoặc ERA). Khi bắt đầu nghiên cứu, những bệnh nhân này đã bổ sung Orenitram hoặc giả dược vào phương pháp điều trị của họ.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram

Tôi nên dùng Orenitram như thế nào? (tiếp)

- Nuôi toàn bộ viên Orenitram. Không bẻ, nhai, nghiền nát hoặc làm vỡ viên Orenitram. Không dùng viên Orenitram bị bẻ hoặc vỡ. **Nếu không nuốt toàn bộ các viên Orenitram, chúng có thể giải phóng quá nhiều thuốc cùng một lúc. Điều này có thể dẫn đến các tác dụng phụ.**



- Nếu bạn bỏ lỡ liều Orenitram, hãy dùng liều đã bỏ lỡ càng sớm càng tốt cùng với thức ăn.

Với Orenitram, tôi có thể lên kế hoạch nhiều hơn và tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp hơn. Tôi có thể chia sẻ ngay cả những điều đơn giản, như nấu ăn hoặc cười, với gia đình và bạn bè.

— Angelie, một bệnh nhân dùng Orenitram

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram

Tôi nên dùng Orenitram như thế nào? (tiếp)

- Nếu bạn bỏ lỡ 2 liều Orenitram trở lên, hãy gọi cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe để xem bạn có cần thay đổi liều của mình hay không.
- Nếu bạn dùng quá nhiều Orenitram, hãy gọi cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất ngay lập tức.

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng hoàn chỉnh trong tài liệu này và Thông tin kê đơn đầy đủ và Thông tin dành cho bệnh nhân cho Orenitram tại www.orenitram.com.

Bắt đầu với Orenitram

Giống như các loại thuốc khác mà bạn có thể đang dùng, Orenitram là một viên nén dạng uống. Orenitram được dùng cùng với thức ăn, thường là 3 lần mỗi ngày (mỗi 8 giờ).*



8 GIỜ



8 GIỜ



Chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ cho bạn biết chính xác cách dùng Orenitram, và cùng nhau, các bạn có thể tạo ra một kế hoạch phù hợp với cuộc sống hằng ngày của mình.

Liều dùng được cá nhân hóa

Vì PAH là một bệnh tiến triển, nhu cầu điều trị của bạn có thể thay đổi theo thời gian. Với Orenitram, bạn có thể không phải bắt đầu dùng một loại thuốc mới. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể tiếp tục tăng hoặc thay đổi liều để đáp ứng các nhu cầu của bạn nhờ đó bạn có thể dùng Orenitram lâu dài và giúp kiểm soát PAH của bạn.[†]

Orenitram có sẵn với 5 hàm lượng viên nén, giúp chuyên gia chăm sóc sức khỏe điều chỉnh liều của bạn dễ dàng hơn.



Có 5 hàm lượng viên nén
Không được trình bày ở kích thước thực tế.

*Orenitram cũng có thể được dùng 2 lần mỗi ngày (12 giờ một lần). Hàm lượng viên nén có thể tăng lên tùy thuộc vào mức độ dung nạp điều trị của bạn.

[†] Không có liều tối đa cho Orenitram, vì vậy chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể tiếp tục tăng liều của bạn miễn là bạn có thể dung nạp thuốc.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram

Tôi nên dùng Orenitram như thế nào? (tiếp)

- Bạn có thể thấy vỏ viên nén trong phân (đại tiện). Điều này thường là bình thường. Vỏ viên nén không tiêu hóa được. Nếu bạn bị viêm túi thừa, vỏ viên nén có thể bị kẹt trong một túi kín hay túi thừa trong ruột.

Biết những gì sẽ xảy ra khi điều trị

Orenitram có thể gây ra các tác dụng phụ. Các tác dụng phụ thường gặp nhất của Orenitram bao gồm nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn, nôn ói, nóng bừng và đau ở cánh tay, chân và hàm.

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ trao đổi với bạn về các tác dụng phụ tiềm ẩn để bạn có thể cảm thấy sẵn sàng và lên kế hoạch trước để giúp giải quyết các tác dụng phụ đó.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram

Các tác dụng phụ có thể có của Orenitram là gì?

Orenitram có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm các triệu chứng PAH trầm trọng hơn.

- Ngưng dùng Orenitram đột ngột có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng PAH của bạn. **Không được thay đổi liều hoặc đột ngột ngưng dùng Orenitram mà không trao đổi trước với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.**

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng hoàn chỉnh trong tài liệu này và Thông tin kê đơn đầy đủ và Thông tin dành cho bệnh nhân cho Orenitram tại www.orenitram.com.

Hỗ trợ ngay từ đầu

Nếu bạn và chuyên gia chăm sóc sức khỏe quyết định rằng Orenitram có thể giúp bạn đạt được mục tiêu điều trị của mình, United Therapeutics, nhà sản xuất Orenitram, sẽ cung cấp hỗ trợ ở mọi bước trong quá trình đó.



Hỗ trợ từ Nhà thuốc Chuyên khoa

Khi bạn dùng Orenitram, bạn không nhận được thuốc từ nhà thuốc địa phương. United Therapeutics hợp tác với các Nhà thuốc Chuyên khoa (SP) chuyên về PAH để cung cấp thuốc cho bạn.

SP của bạn sẽ giúp bạn ở mỗi bước điều trị với Orenitram, chẳng hạn như:

- Lên lịch thăm khám của y tá để giúp bạn bắt đầu điều trị
- Cung cấp hỗ trợ liên tục thông qua thăm khám trực tiếp hoặc trực tuyến và hỗ trợ qua điện thoại 24 giờ
- Điều phối giao thuốc cho bạn



ASSIST là một nhóm tại United Therapeutics cam kết giúp bạn mua thuốc kê đơn, từ trả lời các câu hỏi về thuốc kê đơn đến giải thích bảo hiểm của bạn và nhiều hơn nữa. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.orenitram.com.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram

Các tác dụng phụ có thể có của Orenitram là gì? (tiếp)

- **Các tác dụng phụ thường gặp nhất của Orenitram bao gồm** nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn, nôn ói, nóng bừng và đau ở cánh tay, chân và hàm. Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra của Orenitram. Hãy cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe biết nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào làm phiền bạn hoặc không hết.

HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN

Hãy trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn về Orenitram



\$5 MỖI KHOẢN ĐỒNG THANH TOÁN

Tiết kiệm chi phí

Với chương trình đồng thanh toán của chúng tôi, các bệnh nhân đủ điều kiện có thể chỉ phải trả \$5 mỗi đơn thuốc cho Orenitram.* Tìm hiểu thêm tại www.UTcopay.com.



Orenitram Connect

Để tìm hiểu thêm về việc bổ sung Orenitram vào kế hoạch điều trị PAH của bạn, hãy tham gia Orenitram Connect. Với chương trình này, bạn sẽ nhận được bản tin điện tử, thông tin hữu ích và các công cụ hữu ích khác. Đăng ký tại www.orenitram.com.

***ĐỂ GHI DANH VÀO CHƯƠNG TRÌNH NÀY, BẠN PHẢI HIỂU VÀ ĐỒNG Ý TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU VỀ TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG.**

Các yêu cầu đủ điều kiện cho chương trình này là:
Bệnh nhân phải từ 18 tuổi trở lên mới được sử dụng Chương trình này. Chương trình chỉ có giá trị đối với những bệnh nhân có bảo hiểm thương mại (còn được gọi là bảo hiểm tư nhân) đang dùng thuốc cho chỉ định được FDA phê duyệt. Bệnh nhân sử dụng Medicare, Medicaid hoặc bất kỳ chương trình nào khác của chính quyền tiểu bang hoặc liên bang để thanh toán cho các loại thuốc của họ đều không đủ điều kiện. Bệnh nhân bắt đầu sử dụng bảo hiểm của chính phủ trong thời hạn của Chương trình sẽ không còn đủ điều kiện. Bệnh nhân đủ điều kiện phải là cư dân của Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico.

Để biết chi tiết đầy đủ về chương trình và Các điều khoản và điều kiện, truy cập www.UTcopay.com.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram

Các tác dụng phụ có thể có của Orenitram là gì? (tiếp)

- Gọi cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn để nhận lời khuyên y tế về các tác dụng phụ. Bạn có thể báo cáo các tác dụng phụ cho FDA tại www.fda.gov/MedWatch hoặc gọi 1-800-FDA-1088.

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng hoàn chỉnh trong tài liệu này và Thông tin kê đơn đầy đủ và Thông tin dành cho bệnh nhân cho Orenitram tại www.orenitram.com.



orenitram[®]
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

Nắm bắt nhiều ngày tươi đẹp hơn với Orenitram

Orenitram có thể chỉ là những gì bạn cần để đạt được mục tiêu điều trị của mình

- Orenitram được chứng minh là làm chậm sự tiến triển của PAH và có thể giúp giảm các triệu chứng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của bạn
- Liều dùng được cá nhân hóa có nghĩa là bạn có thể dùng Orenitram trong thời gian dài để giúp kiểm soát PAH*
- United Therapeutics hỗ trợ bạn trong suốt hành trình điều trị với Orenitram

*Không có liều tối đa cho Orenitram, vì vậy chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể tiếp tục tăng liều của bạn miễn là bạn có thể dung nạp thuốc.

Hãy hỏi chuyên gia chăm sóc sức khỏe xem việc bổ sung Orenitram có thể giúp bạn làm được nhiều hơn và giúp kiểm soát PAH của bạn hay không.

Để tìm hiểu thêm về Orenitram, hãy truy cập www.orenitram.com.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG cho Orenitram

Thông tin về nguy cơ được cung cấp trong tài liệu này không bao hàm toàn diện. Để tìm hiểu thêm về Orenitram, hãy trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn. Vui lòng xem Thông tin kê đơn đầy đủ và Thông tin dành cho bệnh nhân tại www.orenitram.com hoặc gọi Dịch vụ khách hàng theo số 1-877-UNITHER (1-877-864-8437).

OREISIconOCT19

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng hoàn chỉnh trong tài liệu này và Thông tin kê đơn đầy đủ và Thông tin


orenitram[®]
treprostiniil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

dành cho bệnh nhân cho Orenitram
tại www.orenitram.com.

Orenitram là nhãn hiệu đã đăng ký của United Therapeutics Corporation.

© 2020 United Therapeutics Corporation. Bảo lưu mọi quyền.

US/ORE/0723

HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN

Hãy trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn về Orenitram

Nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn là nguồn thông tin tốt nhất về các lựa chọn điều trị của bạn. Thảo luận cởi mở, trung thực với họ về mục tiêu điều trị của bạn có thể giúp xác định xem Orenitram có phù hợp với bạn hay không. Dưới đây là một số điều cần suy nghĩ và câu hỏi bạn có thể đặt ra về việc bổ sung Orenitram vào kế hoạch điều trị của mình.

Trước tiên, hãy nghĩ xem liệu bạn có đang tận dụng tối đa phương pháp điều trị hiện tại của mình hay không và liệu đã đến lúc làm nhiều hơn để giúp bạn cảm thấy tốt hơn hay chưa.

Điền thông tin hoặc viết ra mục tiêu điều trị và tương lai của bạn (ví dụ: đi nghỉ với gia đình hoặc có thể làm nhiều việc vặt hằng ngày hơn):



orenitram[®]
treprostinil

EXTENDED-RELEASE TABLETS

Tiếp theo, hãy hỏi chuyên gia chăm sóc sức khỏe những câu hỏi sau và điền vào hoặc viết ra câu trả lời của họ:

Orenitram có thể giúp tôi đạt được mục tiêu điều trị của mình như thế nào?

Orenitram có thể giúp cải thiện các triệu chứng của tôi như thế nào?

Orenitram khác với thuốc hiện tại của tôi như thế nào?

Tôi có thể mong đợi điều gì từ việc điều trị?

Hãy trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe để xem Orenitram có phù hợp với bạn hay không.