

La solution pour inhalation TYVASO® (tréprostinil) et la poudre pour inhalation TYVASO DPI™ (tréprostinil) sont approuvées pour le traitement de l'hypertension pulmonaire avec maladie pulmonaire interstitielle (HTAP-MPI; groupe 3 de l'OMS) afin d'améliorer la capacité à faire de l'exercice.

# Retrouver les moments qui *vous font bouger*

**VIVEZ-LES AVEC UN NOUVEAU SOUFFLE GRÂCE À TYVASO POUR L'HTAP-MPI**

## Renseignements importants sur la sûreté

Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous :

- Avez une faible tension artérielle;
- Avez ou avez eu des problèmes de saignement.

**Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et aux pages 20 et 21, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.**

IPS = inhalateur à poudre sèche; OMS = Organisation mondiale de la Santé.

**TYVASO DPI™**  
*(treprostinil)* INHALATION POWDER

**TYVASO®**  
*(treprostinil)* INHALATION SOLUTION

# COMPRENDRE L'HTAP-MPI

Un diagnostic d'HTAP-MPI peut être intimidant, mais en apprendre davantage sur votre affection et votre traitement peut vous aider à voir l'avenir avec optimisme.

**L'HTAP-MPI signifie hypertension pulmonaire avec maladie pulmonaire interstitielle**, une maladie rare, grave et progressive. Le fait de séparer les lettres de l'acronyme « HTAP-MPI » peut vous donner une bonne idée de la façon dont elles sont liées.

---

**HTAP** HyperTension signifie une tension artérielle élevée.  
Pulmonaire signifie que cela touche les poumons.

...Donc, *l'hypertension pulmonaire* est une tension artérielle élevée dans les poumons.

---

**MPI** La **Maladie Pulmonaire Interstitielle** signifie un groupe de troubles pulmonaires graves et progressifs qui peut endommager les poumons et rendre la respiration plus difficile.

Voici quelques exemples de MPI :

- Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) ou fibrose pulmonaire (FP)
- Fibrose pulmonaire combinée et emphysème (FPCE)
- Maladie du tissu conjonctif (MTC)

## Réunir tous les éléments

Parfois, les personnes atteintes de MPI peuvent également être atteintes de la HTAP, ce qui explique pourquoi vous considérez les termes regroupés comme un seul acronyme. L'HTAP est souvent difficile à diagnostiquer parce que ses symptômes, comme l'essoufflement, la fatigue et la toux, peuvent sembler très semblables à ceux de la MPI. Il n'est pas toujours clair qu'il se passe autre chose.


En fait, avec la FPI (un type de MPI), l'HTAP est présente chez jusqu'à 15 % des patients aux stades précoces de la FPI, voire au moment du diagnostic.

**IL EST IMPORTANT  
DE VOUS FAIRE  
EXAMINER  
RÉGULIÈREMENT  
POUR L'HTAP, car  
l'HTAP peut  
apparaître à tout  
moment au fur et à  
mesure que votre  
MPI progresse.**

# Comment la MPI évolue vers l'HTAP-MPI



La MPI provoque la raideur des tissus pulmonaires, ce qui rend la respiration plus difficile ainsi que l'apport en oxygène dans le sang.



L'HTAP provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins dans les poumons, ce qui rend la circulation sanguine plus difficile et entraîne une augmentation de la pression.



Le cœur doit travailler plus fort pour pousser le sang à travers les poumons, ce qui affaiblit ou endommage le cœur.

## QU'EST-CE QUE TYVASO?

**TYVASO est le premier et le seul médicament approuvé par la FDA pour traiter l'HTAP-MPI. Cela peut augmenter votre capacité à être actif.**

L'HTAP-MPI peut être difficile et déstabilisante. Cela vous cause de la fatigue et vous rend essoufflé, et vous pourriez avoir de la difficulté à marcher plus que sur une courte distance. Le traitement immédiat de l'HTAP-MPI peut être un pas en avant que vous faites pour votre santé, et peut vous aider à profiter davantage des moments les plus précieux.

# Découvrez TYVASO

- ✓ Administre le médicament directement dans vos poumons, là où c'est nécessaire
- ✓ Aide à garder les vaisseaux sanguins ouverts dans vos poumons afin que votre cœur puisse pomper le sang plus facilement
- ✓ Peut accroître votre capacité à être actif tout en réduisant le risque d'aggravation de l'HTAP-MPI

## Renseignements importants sur la sûreté

**Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous (suite) :**

- Êtes atteint d'asthme ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC);
- Êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ne sait pas si l'un ou l'autre des produits pourrait nuire à votre enfant à naître;
- Allaites ou prévoyez allaiter. On ignore si l'un ou l'autre des produits passe dans le lait maternel. Discutez avec votre professionnel de la santé de la meilleure façon de nourrir votre bébé pendant le traitement.

**Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et aux pages 20 et 21, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.**

## Explorer la différence

Se renseigner sur TYVASO peut vous aider à comprendre la différence qu'il peut faire pour votre santé.

Poursuivez votre lecture pour apprendre comment TYVASO peut aider les personnes atteintes d'HTAP-MPI dans ces domaines clés explorés dans le cadre d'une étude clinique :



**La distance que vous pouvez parcourir**



**L'importance de l'effort demandé à votre cœur**



**Le risque que votre HTAP-MPI s'aggrave**

De plus, cette brochure contient des renseignements utiles sur les effets secondaires possibles et des conseils qui pourraient vous aider à les prendre en charge.

## Renseignements importants sur la sûreté

Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sous ordonnance et en vente libre, les vitamines et les suppléments à base de plantes. Les deux produits et d'autres médicaments. peuvent interagir les uns avec les autres.

**Informez-en tout particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez des :**

- Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension ou les maladies cardiaques;
- Médicaments qui diminuent la coagulation sanguine (anticoagulants).
- Diurétiques
- Gemfibrozil (Lopid®) ou rifampine (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)



# ALLER DE L'AVANT

## Le test de marche de 6 minutes

L'HTAP-MPI peut vous rendre difficile de marcher sur une plus longue distance. Le test de marche de 6 minutes (6MWT) peut vous donner une bonne idée de l'importance de l'impact de votre maladie pulmonaire sur votre capacité à rester actif.

Il mesure la distance que vous pouvez parcourir en marchant durant 6 minutes.

**Dans le cadre d'une étude clinique de 16 semaines sur l'HTAP-MPI, les tests 6MWT ont été comparés entre les personnes ayant pris TYVASO et celles ayant pris un placebo (une solution inhalée sans médicament).**



Après 16 semaines, les personnes ayant pris TYVASO dans le cadre d'une étude clinique ont marché

**21 m\* plus loin**  
lors d'un 6MWT

que les personnes qui n'ont pas pris TYVASO.

À la fin de l'étude, celles qui ont pris TYVASO ont amélioré la distance qu'ils pouvaient parcourir en marchant durant 6 minutes. Celles qui ont pris un placebo ont en fait présenté une diminution de la distance qu'ils ont pu parcourir en marchant.

\* 21 mètres correspond à environ 69 pieds.

## Renseignements importants sur la sûreté

**Quels sont les effets secondaires possibles de TYVASO ou TYVASO DPI?**

Les deux produits peuvent causer des **effets secondaires graves**, notamment :

- **Faible tension artérielle** (hypotension symptomatique). Si vous avez une faible tension artérielle, les deux produits peuvent abaisser votre tension artérielle davantage.
- **Problèmes de saignement**. Les deux produits peuvent augmenter le risque de saignement, en particulier chez les personnes qui prennent des anticoagulants.

**Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et aux pages 20 et 21, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.**

**IL A ÉTÉ  
DÉMONTRÉ QUE  
TYVASO AIDE LES  
PATIENTS  
ATTEINTS  
D'HTAP-MPI À  
ÊTRE PLUS  
ACTIFS.**

### Renseignements importants sur la sûreté

**Quels sont les effets secondaires possibles de TYVASO ou de TYVASO DPI?**

**(suite) Les effets secondaires les plus courants** des deux produits sont la toux, les maux de tête, l'irritation et la douleur à la gorge, les nausées, la rougeur du visage et du cou (bouffées vasomotrices), l'évanouissement ou la perte de conscience, les étourdissements, la diarrhée et l'essoufflement. Comme avec les autres prostaglandines inhalées, vous pourriez avoir de la difficulté à respirer après avoir pris TYVASO ou TYVASO DPI car cela peut causer un resserrement des muscles autour des voies respiratoires (bronchospasme). Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires ou si vous avez de la difficulté à respirer.




## RÉDUIRE L'EFFORT DEMANDÉ AU CŒUR

### Analyse de sang NT-proBNP

Le NT-proBNP est une mesure de l'effort demandé au cœur et peut être détecté par une analyse sanguine. Votre médecin peut vérifier vos taux de NT-proBNP au fil du temps pour voir comment l'effort demandé à votre cœur pourrait changer. Si les chiffres sont plus élevés, il y a plus d'effort demandé au cœur; si les chiffres sont plus bas, il y a moins d'effort demandé au cœur.

**À la semaine 16 de l'étude clinique, les patients qui ayant pris TYVASO présentaient moins d'effort demandé au cœur (le NT-proBNP a diminué de**

15 %), alors que les patients qui prenaient le placebo présentaient plus d'effort demandé au cœur (le NT-proBNP a augmenté de 46 %).



Bien que le traitement puisse avoir une incidence sur les résultats de vos analyses du NT-proBNP, on ignore à quel point ces changements pourraient avoir des répercussions sur votre affection.

NT-proBNP=N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (fragment amino-terminal du pro-peptide natriurétique de type B)

### Renseignements importants sur la sûreté

Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous :

- Avez une faible tension artérielle;
- Avez ou avez eu des problèmes de saignement.
- Êtes atteint d'asthme ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC);



# RÉDUIRE L'AGGRAVATION DE LA MALADIE

Au cours de l'étude de 16 semaines, TYVASO a contribué à réduire de 39 % le risque d'aggravation de l'HTAP-MPI.

## Renseignements importants sur la sûreté

**Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous (suite) :**

- Êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ne sait pas si l'un ou l'autre des produits pourrait nuire à votre enfant à naître;
- Allaites ou prévoyez allaiter. On ignore si l'un ou l'autre des produits passe dans le lait maternel. Discutez avec votre professionnel de la santé de la meilleure façon de nourrir votre bébé pendant le traitement.

**Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et aux pages 20 et 21, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.**

**TYVASO DPI**  
*(treprostinil)* INHALATION  
POWDER

**TYVASO**  
*(treprostinil)* INHALATION  
SOLUTION

# COMMENT IL FONCTIONNE

TYVASO est inhalé directement dans les poumons où il agit pour aider à ouvrir les vaisseaux sanguins.

**TYVASO PERMET  
D'ADMINISTRER  
RAPIDEMENT LE  
MÉDICAMENT À L'ENDROIT  
DE LA MALADIE, LÀ OÙ C'EST  
NÉCESSAIRE.**

Dans le cadre de l'étude clinique, les patients qui prenaient TYVASO étaient plus susceptibles de présenter une toux, des maux de tête et une irritation/douleur à la gorge que de présenter des nausées et de la diarrhée.

## Renseignements importants sur la sûreté

Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sous ordonnance et en vente libre, les vitamines et les suppléments à base de plantes. Les deux produits peuvent interagir avec d'autres médicaments.

**Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et aux pages 20 et 21, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.**

# VOS OPTIONS DE DISPOSITIF POUR TYVASO

La première étape pour vous sentir à l'aise avec TYVASO est de vous familiariser avec votre appareil. Discutez avec votre professionnel de la santé pour savoir quelle option vous convient le mieux.

## TYVASO DPI (inhalateur à poudre sèche)

TYVASO DPI est inhalé à l'aide d'un petit inhalateur portatif.

## Nébuliseur TYVASO

TYVASO est inhalé à l'aide d'un nébuliseur portatif sans fil.

Obtenez plus de détails et des vidéos utiles sur la façon d'utiliser votre dispositif TYVASO au [www.TYVASO.com/resources](http://www.TYVASO.com/resources).

## Renseignements importants sur la sûreté

Informez-en tout particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez des :

- Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension ou les maladies cardiaques;
- Médicaments qui diminuent la coagulation sanguine (anticoagulants).
- Diurétiques
- Gemfibrozil (Lopid®) ou rifampine (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)

**TYVASO DPI**  
(treprostini) INHALATION  
POWDER

**TYVASO**  
(treprostini) INHALATION  
SOLUTION

# PRENDRE TYVASO

## TYVASO DPI tient dans la paume de votre main

TYVASO est offert sous forme d'**Inhalateur à poudre sèche (Dry Powder Inhaler, DPI)**.

Cet inhalateur **petit et portable** utilise des cartouches et est conçu pour une **utilisation facile**.

- Facilement **portable**
- **Cartouches à dose unique** préremplies de médicament
- Une seule inspiration par cartouche, **4 fois par jour**

**Prendre une dose est aussi simple que : UNE SEULE INSPIRATION — OUVRIR, CHARGER, INHALER**

**98 %**

**Taux de satisfaction des patients de 98 %** avec TYVASO DPI

TYVASO DPI a reçu des **niveaux de satisfaction élevés** de 45 personnes sur 46 participant à une étude clinique qui sont passées du nébuliseur TYVASO\*.

\* Dans l'étude clinique, 51 personnes atteintes d'HTAP qui ont utilisé le nébuliseur TYVASO durant au moins 3 mois sont passées à TYVASO DPI. Les chercheurs ont consigné les effets secondaires, et après 3 semaines, 46 patients ont évalué leur satisfaction à l'égard de TYVASO DPI dans un questionnaire.

TYVASO DPI s'intègre à votre routine quotidienne



Réveil



Dîner



Souper



Au coucher

**IL EST IMPORTANT QUE VOUS PRENIEZ TYVASO DPI 4 FOIS PAR JOUR POUR PROFITER PLEINEMENT DU MÉDICAMENT.**

## Renseignements importants sur la sûreté

Quels sont les effets secondaires possibles de TYVASO ou TYVASO DPI?

Les deux produits peuvent causer des **effets secondaires graves**, notamment :

- **Faible tension artérielle** (hypotension symptomatique). Si vous avez une faible tension artérielle, les deux produits peuvent abaisser votre tension artérielle davantage.
- **Problèmes de saignement**. Les deux produits peuvent augmenter le risque de saignement, en particulier chez les personnes qui prennent des anticoagulants.

## Atteindre votre dose d'entretien cible

Votre médecin collaborera avec vous pour augmenter votre dose jusqu'à ce que vous atteigniez votre dose d'entretien cible. Ce processus s'appelle « titrage ».

La plupart des personnes commencent par la cartouche de 16 mcg, 4 fois par jour, et augmentent leur dose toutes les 1 à 2 semaines jusqu'à ce qu'elles atteignent leur dose d'entretien cible.



Si la dose prescrite est supérieure à 64 mcg par séance de traitement, plus d'une cartouche sera nécessaire par séance.

## Renseignements importants sur la sûreté

### Quels sont les effets secondaires possibles de TYVASO ou de TYVASO DPI? (suite)

**Les effets secondaires les plus courants** des deux produits sont la toux, les maux de tête, l'irritation et la douleur de la gorge, les nausées, la rougeur du visage et du cou (bouffées vasomotrices), l'évanouissement ou la perte de conscience, les étourdissements, la diarrhée et l'essoufflement. Comme avec les autres prostaglandines inhalées, vous pourriez avoir de la difficulté à respirer après avoir pris TYVASO ou TYVASO DPI car cela peut causer un resserrement des muscles autour des voies respiratoires (bronchospasme). Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires ou si vous avez de la difficulté à respirer.

**Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et aux pages 20 et 21, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.**

**TYVASO DPI™**  
(treprostiniil) INHALATION  
POWDER

**TYVASO**  
(treprostiniil) INHALATION  
SOLUTION

# PRENDRE TYVASO

## Le nébuliseur TYVASO s'adapte à votre journée

Ce **nébuliseur portatif** permet d'administrer le médicament à la maison ou en déplacement.

### Une façon simple de se rappeler : Comptez jusqu'à 4 et ajoutez-en 1

- 1** Configurer l'appareil **1 fois chaque matin**
- 2-3** Chaque séance dure environ **2 à 3 minutes**.
- 4** Prendre TYVASO **4 fois par jour** pendant les heures d'éveil
- +1** Nettoyer le dispositif **1 fois chaque soir**

TYVASO s'intègre à votre routine quotidienne



Réveil



Dîner



Souper



Au coucher

**IL EST IMPORTANT QUE VOUS PRENIEZ TYVASO 4 FOIS PAR JOUR POUR PROFITER PLEINEMENT DU MÉDICAMENT.**

### Renseignements importants sur la sûreté

Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous :


- Avez une faible tension artérielle;
- Avez ou avez eu des problèmes de saignement.
- Êtes atteint d'asthme ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC);

**Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et aux pages 20 et 21, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.**

## Atteindre votre dose d'entretien cible

Votre médecin collaborera avec vous pour augmenter le nombre d'inspirations par séance chaque semaine, jusqu'à ce que vous atteigniez la dose d'entretien cible de 9 à 12 inhalations, 4 fois par jour. Ce processus s'appelle « titrage ».

Généralement, les personnes qui prennent TYVASO commencent par 3 inhalations, 4 fois par jour, puis augmentent d'une inhalation par semaine, jusqu'à ce qu'elles atteignent la dose cible de 9 à 12 inhalations.



\* Votre médecin pourrait recommander un calendrier légèrement différent.

## Renseignements importants sur la sûreté

**Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous (suite) :**


- Êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ne sait pas si l'un ou l'autre des produits pourrait nuire à votre enfant à naître;
- Allaites ou prévoyez allaiter. On ne sait pas si l'un ou l'autre des produits passe dans le lait maternel. Discutez avec votre professionnel de la santé de la meilleure façon de nourrir votre bébé pendant le traitement.



# Atteindre votre dose d'entretien cible pour maximiser les bienfaits

Il est important d'atteindre votre dose d'entretien cible afin que vous puissiez profiter pleinement du médicament et être plus actif.

À la semaine 16 de l'étude clinique, les patients qui avaient atteints entre **10 et 12 inhalations** avec le nébuliseur TYVASO présentaient une **amélioration de 67 % de plus** dans leur distance parcourue lors du 6MWT que ceux qui n'avaient atteints que 7 à 9 inhalations.



## CONSEILS IMPORTANTS POUR LE TITRAGE

- Lorsque vous augmentez vos inhalations chaque semaine, vous pourriez présenter des effets secondaires
- Parlez au personnel infirmier ou à votre médecin pour vous aider à prendre en charge les effets secondaires afin d'atteindre votre dose d'entretien cible et de profiter de tous les avantages de TYVASO
- NE PAS CESSER de prendre TYVASO sans en parler d'abord à votre professionnel de la santé

\* 18 mètres équivaut à environ 59 pieds et 30 mètres à environ 98 pieds.

## Renseignements importants sur la sûreté

Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sous ordonnance et en vente libre, les vitamines et les suppléments à base de plantes. Les deux produits peuvent interagir avec d'autres médicaments.

**Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et aux pages 20 et 21, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.**

# Se préparer à un nouveau médicament

## **Vous pourriez présenter des effets secondaires...**

Votre équipe soignante vous aidera à comprendre votre médicament, y compris les effets secondaires possibles. Les effets secondaires les plus courants sont la toux, les maux de tête, l'irritation et la douleur à la gorge et les étourdissements. Le fait d'avoir un plan de prise en charge des effets secondaires possibles peut vous aider à vous sentir préparé et à rester sur la bonne voie pour profiter pleinement des avantages de votre médicament.

**Assurez-vous de communiquer avec le personnel infirmier pour savoir ce que vous pouvez faire pour aider à prendre en charge les effets secondaires tout en poursuivant le traitement, comme :**

### **TOUX**

- ✓ Revoir la technique appropriée
- ✓ Avant le traitement, manger une petite quantité de yogourt, de miel ou de beurre d'arachide, ou boire de l'eau très froide ou tiède

### **MAUX DE TÊTE**

- ✓ Utiliser un analgésique en vente libre, comme l'acétaminophène

### **IRRITATION DE LA GORGE**

- ✓ Au besoin, utilisez un vaporisateur pour la gorge pour engourdir votre gorge avant le traitement

Parlez à votre professionnel de la santé pour savoir si le ralentissement du rythme auquel vous augmentez votre dose ou optimisez les autres médicaments que vous prenez pourrait vous aider.

**Revoyez la technique appropriée pour votre appareil dans les manuels d'instructions d'utilisation qui se trouvent dans la pochette ou au [www.TYVASO.com](http://www.TYVASO.com).**

**Ces conseils pourraient vous aider à prendre en charge les effets secondaires courants de TYVASO, selon l'expérience du professionnel de la santé. Ils ne sont pas destinés à servir de conseils médicaux.**

## **Renseignements importants sur la sûreté**

**Informez-en tout particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez des :**

- Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension ou les maladies cardiaques;



- Médicaments qui diminuent la coagulation sanguine (anticoagulants).
- Diurétiques
- Gemfibrozil (Lopid®) ou rifampine (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)



# SOUTIEN À CHAQUE ÉTAPE

## Commencer votre parcours thérapeutique avec TYVASO



Le programme Archways de United Therapeutics est un programme de soutien éducatif virtuel qui offre des renseignements et des ressources utiles sur la maladie pour le traitement. Archways est offert gratuitement aux patients et aux soignants lorsque vous commencez votre parcours de traitement avec TYVASO.

Pour commencer, suivez l'une de ces trois étapes simples :

- Appelez le **1 888 327-2492**
- Textez « **START** » au **882724** (*des tarifs standard de messages et de données peuvent s'appliquer*)
- Consultez le site **www.UTArchways.com**

United Therapeutics et le programme Archways ne fournissent pas de conseils médicaux. Nous vous conseillons de consulter votre professionnel de la santé si vous avez des questions ou des préoccupations spécifiques au sujet de votre traitement.

## Collaborer avec la pharmacie spécialisée

TYVASO n'est offert que par l'entremise de pharmacies spécialisées qui mettent l'accent sur la formation à domicile et le soutien jour et nuit.

Votre fournisseur de la pharmacie spécialisée (PS) fait partie de votre équipe de soins de santé.

**Que se passe-t-il ensuite** : Votre fournisseur de la PS vous appellera.

**Répondez à l'appel** : Lorsqu'il communiquera avec vous pour la première fois, le fournisseur de la PS peut vous appeler à partir d'un numéro 866 ou 877 que vous ne reconnaîtrez peut-être pas. Puisqu'ils ne peuvent pas vous fournir le médicament s'ils ne vous parlent pas, assurez-vous de répondre à l'appel pour commencer et continuer le traitement.

Un membre du personnel infirmier de la PS vous donnera des instructions personnelles sur l'utilisation de TYVASO et vous fournira un soutien continu. Votre infirmier(ère) de la PS peut vous rendre visite ou vous appeler régulièrement pendant que vous vous habituez à utiliser TYVASO.

## Renseignements importants sur la sûreté

### Quels sont les effets secondaires possibles de TYVASO ou TYVASO DPI?

Les deux produits peuvent causer des **effets secondaires graves**, notamment :

- **Faible tension artérielle** (hypotension symptomatique). Si vous avez une faible tension artérielle, les deux produits peuvent abaisser votre tension artérielle davantage.
- **Problèmes de saignement**. Les deux produits peuvent augmenter le risque de saignement, en particulier chez les personnes qui prennent des anticoagulants.

**Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et aux pages 20 et 21, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.**



**ASSIST peut vous aider à déterminer si vous êtes admissible aux programmes d'aide aux patients de United Therapeutics. Appelez ASSIST au 1 877 864-8437.**

**5 \$  
QUOTE-  
PART**

## Programme d'assistance avec quote-part

Grâce au programme d'assistance avec quote-part de TYVASO, la plupart des patients admissibles paient aussi peu qu'une quote-part de 5 \$ pour chaque ordonnance de TYVASO ou de TYVASO DPI\*.

**Apprenez comment vous inscrire au [www.UTcopay.com](http://www.UTcopay.com) ou appelez ASSIST au 1 877 864-8437.**

\* Les critères d'admissibilité à ce programme sont les suivants :

- Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour utiliser ce programme.
- Les patients qui utilisent Medicare, Medicaid ou tout autre programme gouvernemental d'État ou fédéral pour payer leurs médicaments ne sont pas admissibles. Les patients qui commencent à bénéficier d'une couverture gouvernementale pendant la durée du programme ne seront plus admissibles.
- Le programme n'est offert que pour les patients ayant une assurance commerciale (aussi connue sous le nom d'assurance privée) qui prennent le médicament pour une indication approuvée par la FDA.
- Les patients admissibles doivent être des résidents des États-Unis ou de Porto Rico. Le programme est assujéti à d'autres restrictions de la loi de l'État. Les patients résidant dans certains États pourraient ne pas être admissibles au programme.

## Renseignements importants sur la sûreté

### Quels sont les effets secondaires possibles de TYVASO ou de TYVASO DPI?

**(suite) Les effets secondaires les plus courants** des deux produits sont la toux, les maux de tête, l'irritation et la douleur à la gorge, les nausées, la rougeur du visage et du cou (bouffées vasomotrices), évanouissement ou perte de conscience, étourdissements, diarrhée et essoufflement. Comme avec les autres prostaglandines inhalées, vous pourriez avoir de la difficulté à respirer après avoir pris TYVASO ou TYVASO DPI car cela peut causer un resserrement des muscles autour des voies respiratoires (bronchospasme). Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires ou si vous avez de la difficulté à respirer.



# RENSEIGNEMENTS IMPORTANTES SUR LA SÛRETÉ

Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous :

- Avez une faible tension artérielle.
- Avez ou avez eu des problèmes de saignement.
- Êtes atteint d'asthme ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).
- Êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ne sait pas si l'un ou l'autre des produits pourrait nuire à votre enfant à naître;
- Allaites ou prévoyez allaiter. On ignore si l'un ou l'autre des produits passe dans le lait maternel. Discutez avec votre professionnel de la santé de la meilleure façon de nourrir votre bébé pendant le traitement.

Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sous ordonnance et en vente libre, les vitamines et les suppléments à base de plantes. Les deux produits peuvent interagir avec d'autres médicaments.

**Informez-en tout particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez des :**

- Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension ou les maladies cardiaques;
- Médicaments qui diminuent la coagulation sanguine (anticoagulants).
- Diurétiques
- Gemfibrozil (Lopid®) ou rifampine (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)

**Quels sont les effets secondaires possibles de TYVASO ou TYVASO DPI?**

Les deux produits peuvent causer des **effets secondaires graves**, notamment :

- **Faible tension artérielle** (hypotension symptomatique). Si vous avez une faible tension artérielle, les deux produits peuvent abaisser votre tension artérielle davantage.
- **Problèmes de saignement**. Les deux produits peuvent augmenter le risque de saignement, en particulier chez les personnes qui prennent des anticoagulants.

**Les effets secondaires les plus courants** des deux produits sont la toux, les maux de tête, l'irritation et la douleur de la gorge, les nausées, la rougeur du visage et du cou (bouffées vasomotrices), l'évanouissement ou la perte de conscience, les étourdissements, la diarrhée et l'essoufflement.

Comme avec les autres prostaglandines inhalées, vous pourriez avoir de la difficulté à respirer après avoir pris TYVASO ou TYVASO DPI car cela peut causer un resserrement des muscles autour des voies respiratoires (bronchospasme). Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires ou si vous avez de la difficulté à respirer.

**Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au [www.fda.gov/MedWatch](http://www.fda.gov/MedWatch) ou appelez le 1 800 FDA-1088.**

## Que sont TYVASO et TYVASO DPI?

La solution pour inhalation TYVASO (tréprostiniil) et la poudre pour inhalation TYVASO DPI (tréprostiniil) sont des médicaments d'ordonnance utilisés chez les adultes pour traiter l'hypertension pulmonaire avec maladie pulmonaire interstitielle (HTAP-MPI; groupe 3 de l'OMS), qui est une tension artérielle élevée dans les poumons causée par de l'inflammation et parfois des cicatrices dans les poumons. TYVASO ou TYVASO DPI peut améliorer la capacité à faire de l'exercice.

Les renseignements sur les risques fournis ici ne sont pas complets. Pour en savoir plus sur TYVASO ou TYVASO DPI, parlez-en à votre professionnel de la santé. Veuillez consulter les renseignements posologiques complets pour **TYVASO** ou **TYVASO DPI**, les manuels d'utilisation pour le système d'inhalation **TD-100** et **TD-300** TYVASO® et la **poudre pour inhalation TYVASO DPI™**, ainsi que des renseignements supplémentaires au [www.TYVASO.com](http://www.TYVASO.com) ou appeler le 1 877-UNITHER (1 877 864-8437).

TYVISIconMAY2022(PH-ILD)



**TYVASO DPI**  
(treprostiniil) INHALATION  
POWDER



**TYVASO**  
(treprostiniil) INHALATION  
SOLUTION

# À vous d'agir

## DISCUTEZ D'UN PLAN AVEC VOTRE MÉDECIN POUR VOUS AIDER À PROFITER PLEINEMENT DE TYVASO

### TYVASO...

- ✓ est le premier et le seul médicament approuvé par la FDA pour traiter l'HTAP-MPI
- ✓ augmente votre capacité à rester actif
- ✓ diminue le risque d'aggravation de l'HTAP-MPI
- ✓ réduit l'importance de l'effort demandé à votre cœur
- ✓ est administré directement aux poumons, là où c'est nécessaire
- ✓ est administré avec des options d'appareils portatifs qui vous suivent là où votre journée vous mène

## Aller de l'avant avec TYVASO

Obtenez de plus amples renseignements et inscrivez-vous au [www.TYVASOsignup.com](http://www.TYVASOsignup.com) pour recevoir des mises à jour.

### Renseignements importants sur la sûreté

**Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous :**

- Avez une faible tension artérielle;
- Avez ou avez eu des problèmes de saignement.
- Êtes atteint d'asthme ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC);

**Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et aux pages 20 et 21, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.**

**TYVASO DPI™**  
(treprostinil) INHALATION  
POWDER



TYVASO est une marque déposée et TYVASO DPI est une marque de commerce de United Therapeutics Corporation.  
© 2022 United Therapeutics Corporation. Tous droits réservés. US/TYV/0773 Imprimé aux É.-U.

**TYVASO**  
(treprostinil) INHALATION  
SOLUTION