

# REMODULIN

## PORQUE TENHO MAIS A VIVER

Ajudando você a dar o próximo  
passo com a terapia de bomba  
Remodulin®

### O QUE É O REMODULIN?

Remodulin é um medicamento de receita usado para tratar adultos com hipertensão arterial pulmonar (HAP; Grupo 1 da OMS), que é a alta pressão arterial nas artérias de seus pulmões. Remodulin pode reduzir os sintomas associados ao exercício. O Remodulin foi estudado principalmente em pacientes com sintomas de classe funcional II-IV da Associação de Cardiologia de Nova Iorque (NYHA, New York Heart Association). Não se sabe se o Remodulin é seguro e eficaz em crianças. Em pessoas com HAP que precisam mudar do epoprostenol, o Remodulin é aprovado para retardar a piora dos sintomas.

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES SOBRE O Remodulin

Antes de tomar o Remodulin, informe seu profissional da saúde se você:

- Ter outras condições médicas ou tomar outros medicamentos que possam afetar seu uso de Remodulin, aumentando o risco de efeitos colaterais ou diminuindo a eficácia do medicamento.
- Tem problemas no fígado ou rins. Sua dose de Remodulin pode precisar ser ajustada se você tiver problemas hepáticos.

Consulte as informações de segurança importantes completas nas páginas 10 e 11 e as informações de prescrição completas e informações ao paciente no encarte.

# O que o Remodulin pode fazer por você?

Se você e seu médico não estiverem vendo as melhoras que você esperava em sua capacidade de se exercitar e nos sintomas da HAP, pode ser hora de considerar um tratamento com prostaciclina como o Remodulin. Em apenas 3 meses, o Remodulin pode ajudá-lo a aumentar sua capacidade de praticar exercícios e a permanecer mais ativo diariamente, para que você possa voltar a fazer mais coisas que você ama, com as pessoas que você ama.

## É um grande passo, mas você terá apoio

A ideia de iniciar a terapia com a bomba Remodulin pode parecer intimidadora no início, mas é um passo positivo para fazer mais coisas que são importantes para você, como passar tempo com sua família ou fazer tarefas diárias.

E lembre-se, **você não está sozinho**. Você terá o apoio de seus profissionais de saúde, farmácia especializada, amigos e familiares, e outros, como você, que são afetados pela HAP. Você também terá acesso a programas de apoio da United Therapeutics, uma empresa dedicada a fornecer terapias e opções de entrega inovadoras para ajudar a facilitar a vida com HAP.

### Porque você tem mais a viver

Aprenda o máximo que puder. Quando tiver consultas com seu médico, traga um caderno e peça que alguém vá com você para fazer anotações e ajudar com todas as informações.

— Um paciente com Remodulin

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES SOBRE Remodulin (CONTINUAÇÃO)

Antes de tomar o Remodulin, informe seu profissional da saúde se você:

- Tem pressão arterial baixa ou problemas de sangramento.
- Está tomando gemfibrozil (para colesterol alto), rifampicina (para infecção) ou outros medicamentos que afetam as enzimas hepáticas. Seu médico pode precisar ajustar sua dose de Remodulin.

Consulte as informações de segurança importantes completas nas páginas 10 e 11 e as informações de prescrição completas e informações ao paciente no encarte.


HAP = hipertensão arterial pulmonar.

# Remodulin – uma história de ajuda às pessoas com HAP

**N.º 1 PRESCRITO**


Como a terapia de bomba n.º 1 prescrita para HAP nos EUA, Remodulin tem sido usado desde 2002 em milhares de pessoas com HAP.

## Como o Remodulin funciona



Vaso com HAP

Na HAP, o corpo não produz prostaciclina suficiente, uma substância natural que mantém seus vasos sanguíneos abertos e funcionando adequadamente.



Frasco com tratamento com Remodulin

Remodulin age como prostaciclina natural em seu corpo para ajudar a manter os vasos sanguíneos em seus pulmões abertos.

## Ajudando você a ser mais ativo

Remodulin ajuda a facilitar o coração a bombear sangue para os pulmões, fornecendo a prostaciclina que seu corpo precisa ao longo do dia.

Remodulin pode reduzir seus sintomas de HAP, como falta de ar e fadiga, e melhorar certos fatores usados para avaliar o risco da sua doença piorar.

**Visite [Remodulin.com](http://Remodulin.com) para obter mais informações sobre a vida com Remodulin.**

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES SOBRE Remodulin (CONTINUAÇÃO)

Antes de tomar o Remodulin, informe seu profissional da saúde se você:

- Estiver grávida, amamentando ou planejando engravidar. Não se sabe se o Remodulin prejudicará seu bebê que ainda não nasceu ou se o Remodulin é transferido para o leite materno.

Quais são os efeitos colaterais sérios do Remodulin?

- Infusões intravenosas (IV) contínuas de Remodulin administradas usando uma bomba de infusão externa, com um tubo colocado em uma veia central dentro do tórax, estão associadas ao risco de infecções na corrente sanguínea e sepse, que podem ser fatais. Portanto, a infusão subcutânea (SC) contínua administrada logo abaixo da pele é o tipo preferido de administração.

**REMODULIN**  
(treprostinil) Injection  
Experience • Innovation • Support

## Opções de bomba projetadas com você em mente

Remodulin é administrado através de um sistema de bomba, não diferentemente daqueles usados por pessoas com diabetes. Com o Remodulin, você recebe dispensação contínua de medicamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você possa se sentir confiante de que está recebendo o medicamento de que precisa o tempo todo. E a United Therapeutics continua a desenvolver opções de bomba para ajudar a simplificar a administração de Remodulin.

A administração do Remodulin pode levar algum tempo para se acostumar, mas basta dar um passo de cada vez e contar com o apoio disponível de seu enfermeiro da farmácia especializada e da equipe de saúde. Juntos, vocês podem encontrar uma maneira de incorporar o Remodulin à sua rotina e estilo de vida diários.

### **INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES SOBRE Remodulin** (CONTINUAÇÃO)

#### **Quais são os efeitos colaterais sérios do Remodulin?**

- Piora dos sintomas da HAP. Não pare de tomar nem reduza muito sua dose de Remodulin sem consultar seu médico.
- Pressão arterial baixa (hipotensão sintomática). Se você tiver pressão arterial baixa ou estiver tomando medicamentos que diminuem sua pressão arterial, o risco de pressão arterial baixa aumenta.

**Consulte as informações de segurança importantes completas nas páginas 10 e 11 e as informações de prescrição completas e informações ao paciente no encarte.**

# Remodulin via subcutânea (SC)

Remodulin via SC é aplicado no corpo através de um tubo muito fino (cânula) inserido logo abaixo da pele.

## Como o Remodulin via SC beneficia você:

- Opções de bombas pequenas e discretas (menores que as bombas IV)
- Nenhuma cirurgia necessária
- Menor risco de infecções na corrente sanguínea em comparação com a administração IV
- Maior conveniência — o medicamento não precisa ser misturado em casa
- A maioria das bombas SC precisa ser reabastecida a cada 2 a 3 dias

**A via SC é a maneira preferida de tomar Remodulin devido ao risco reduzido de infecções na corrente sanguínea.**

## Bomba SC disponível

### Remunity®

A bomba Remunity para Remodulin foi especificamente projetada pensando em você. Apenas 5,08 cm de diâmetro, 1,9 cm de espessura e pesando apenas 48,2 g, o Remunity oferece uma opção mais discreta para administração via SC.

Outras bombas SC também podem estar disponíveis e podem ser discutidas com sua farmácia especializada.

### Opções flexíveis de preenchimento para acomodar seu estilo de vida

Com a Remunity, os cassetes podem ser preenchidos em casa por você ou por seu cuidador, ou pré-preenchidos por sua farmácia especializada e entregues diretamente em sua casa.

**Saiba mais sobre a bomba Remunity em [Remunity.com](https://www.remunity.com).**

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA A COMUNIDADE

### Advertências e precauções

Não use o sistema fora das condições listadas no Guia do Usuário. Guarde o Manual do usuário para referência futura. Consulte o Manual do usuário para todas as advertências e precauções. O não cumprimento das seguintes advertências e precauções pode resultar em danos.

Limitado ao uso com Remodulin. Apenas cassetes de Remunity podem ser usados com a bomba Remunity. A bomba Remunity destina-se apenas ao uso com conjuntos de infusão liberados pela FDA: Medtronic Quick-set Infusion Set Set (MMT-392, MMT-393), Medtronic Silhouette Infusion Set (MMT-373) e Smiths Medical Cleo 90 Infusion Set (21-7230-24, 21-7220-24).

IV=intravenoso.



# Converse com seu médico

Certifique-se de discutir suas metas para o tratamento com seu médico. Juntos, vocês podem falar sobre os benefícios e riscos de cada opção de entrega para determinar a melhor via de administração e bomba para você.

## **INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES SOBRE Remodulin** (CONTINUAÇÃO)

### **Quais são os efeitos colaterais sérios do Remodulin?**

- Problemas de sangramento. Remodulin pode aumentar o risco de sangramento em pessoas que tomam anticoagulantes (anticoagulantes).

### **Quais são os possíveis efeitos colaterais de Remodulin?**

- Em estudos clínicos da infusão via SC de Remodulin, a maioria das pessoas apresentou dor no local da infusão e reação no local da infusão (vermelhidão, inchaço e erupção cutânea). Esses sintomas foram, às vezes, graves e, às vezes, exigiram tratamento com narcóticos ou descontinuação de Remodulin.

**Consulte as informações de segurança importantes completas nas páginas 10 e 11 e as informações completas para prescrição e informações ao paciente no encarte**

## Remodulin via intravenosa (IV)

Remodulin via IV é administrado diretamente na corrente sanguínea através de um tubo estreito e flexível chamado cateter, que é colocado em uma veia da parte superior do tórax. O procedimento pode exigir uma noite de internação hospitalar.

### Como o Remodulin via IV beneficia você:

- O medicamento é preparado por você em casa ou pela farmácia especializada, que enviará os cassetes pré-misturados diretamente para você
- O reservatório da bomba é geralmente reabastecido a cada 2 dias
- Nenhuma dor no local da infusão é normalmente observada
- Não são necessárias bolsas de gelo para administração

**Um enfermeiro de farmácia especializada estará disponível para ajudar você a se sentir confiante ao iniciar a terapia de bomba com Remodulin via IV. Sua equipe de saúde também pode ajudar a incluir pacientes elegíveis\* em um programa de pré-mistura para economizar tempo e prevenir quaisquer erros potenciais ao misturar o medicamento.**

## Bomba disponível

### CADD<sup>®</sup>-Solis

- Uma bomba IV confiável e durável
- 10,16 cm x 12,7 cm x 4,06 cm (sem incluir cassete ou outros acessórios)

Outras bombas IV também podem estar disponíveis e podem ser discutidas com sua farmácia especializada.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES SOBRE Remodulin (CONTINUAÇÃO)

### Quais são os possíveis efeitos colaterais de Remodulin?

- A infusão IV de Remodulin administrada por meio de uma bomba externa foi associada ao risco de infecções na corrente sanguínea, inchaço no braço, sensação de formigamento, hematoma e dor.
- Os efeitos colaterais mais comuns observados com o Remodulin via SC ou IV foram cefaleia, diarreia, náusea, erupção cutânea, dor na mandíbula, alargamento dos vasos sanguíneos (vasodilatação) e inchaço devido à retenção de líquidos (edema). Estes não são todos os efeitos colaterais possíveis do Remodulin. Ligue para o seu médico para

obter orientação médica sobre efeitos colaterais.

\*O programa SPmix destina-se a pacientes que estão tomando uma dose consistente de Remodulin por pelo menos um mês e que têm realizado a mistura por pelo menos três meses.

## Introdução ao Remodulin

À medida que você começa o tratamento, você estará cercado por uma equipe que pode fornecer apoio em cada etapa do caminho, ajudar a garantir que suas perguntas sejam respondidas e ajudar você a se sentir confiante ao avançar com sua terapia de Remodulin.



### 1: Preencha o formulário de encaminhamento

Sua equipe de saúde iniciará o processo de iniciação do tratamento preenchendo e enviando seu formulário de encaminhamento a um profissional de farmácia especializada.



### 2: Verificar a cobertura do seguro

A farmácia especializada ou o consultório do seu médico entrará em contato com sua seguradora para ajudar a determinar e verificar sua cobertura. Eles podem determinar se você se qualifica para o programa de assistência Co-Pay.

**DICA:** Sua seguradora ou farmácia especializada entrará em contato com você para discutir sua cobertura, portanto, certifique-se de atender ao seu telefone.



### 3: Inicie sua terapia com Remodulin

Você será conectado com um enfermeiro dedicado da farmácia especializada que pode fornecer apoio e educação, juntamente com treinamento em casa sobre como preparar seu medicamento e usar sua bomba. O enfermeiro virá quantas vezes forem necessárias para ajudá-lo a se sentir confortável com sua terapia.



### 4: Envie os suprimentos dentro do cronograma

A farmácia especializada cuidará para coordenar a entrega de seus medicamentos e suprimentos. Eles enviarão reabastecimentos e suprimentos regularmente, para que você sempre tenha quando precisar.



### 5: Conecte-se aos serviços de apoio

Você pode acessar vários recursos e programas de apoio por meio da United Therapeutics, como o Programa de Apoio do Remodulin, a comunidade social (Facebook e YouTube) e muito mais.



# Facilitando a terapia com programas de apoio por meio da United Therapeutics

**US\$ 0  
POR  
PRESCRIÇÃO**

## Programa de assistência Co-Pay

A United Therapeutics oferece assistência financeira para atender aos seus pagamentos conjuntos para o tratamento com Remodulin. De acordo com este programa de assistência de copagamento, a maioria dos pacientes elegíveis\* que se inscreverem paga um copagamento de apenas US\$ 0 por prescrição, até uma economia de custo de US\$ 8.000 por ano.

As **informações de inclusão estão disponíveis em [www.UTcopay.com](http://www.UTcopay.com) ou ASSIST no número 1-877-864-8437.**



## ASSIST

Outras opções de assistência financeira podem estar disponíveis se você não se qualificar para este programa. Entre em contato com a ASSIST para obter mais informações. ASSIST está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h Horário do leste dos EUA. Sua equipe de apoio e soluções de acesso, ou conselheiro da ASSIST, ajudará a determinar se você se qualifica para assistência financeira.



## Programa de apoio ao Remodulin

A United Therapeutics criou um programa para apoiar as pessoas que tomam Remodulin. Ao se inscrever, você receberá uma série de e-mails criados para fornecer informações e dicas importantes, onde quer que você esteja em sua jornada de tratamento.

Escaneie o código QR aqui ou visite **[Remodulin.com](http://Remodulin.com)** para se inscrever.



## My Remodulin: Informações sobre terapias personalizadas

O portal on-line My Remodulin está disponível para todos os novos pacientes que iniciam o uso de Remodulin e foi projetado para oferecer recursos educacionais e de suporte úteis à medida que você inicia e permanece em tratamento.

Com o My Remodulin, você pode acessar informações úteis sobre sua bomba e terapia, todas adaptadas especificamente para você e suas necessidades de tratamento.

\*Requisitos de elegibilidade:

- você precisa ter 18 anos de idade ou mais
- O programa é válido apenas para pacientes com seguro comercial (também conhecido como privado) que estejam tomando o medicamento para uma indicação aprovada pela FDA
- pacientes que usam Medicare, Medicaid ou qualquer outro programa governamental estadual ou federal para pagar seus medicamentos não são elegíveis. os pacientes que começarem a utilizar cobertura governamental durante a vigência do

**REMODULIN**<sup>®</sup>  
(treprostinil) Injection  
Experience • Innovation • Support

programa não serão mais elegíveis

- os pacientes elegíveis devem ser residentes nos Estados Unidos ou em Porto Rico

o programa está sujeito a restrições legais estaduais adicionais. os pacientes que residam em estados específicos podem não ser elegíveis para o Programa. Nulo onde proibido, tributado ou restrito por lei.

Outros termos e condições se aplicam. Acesse [www.UTcopay.com](http://www.UTcopay.com).

## **Bomba Remunity® para injeção de Remodulin® (treprostinil) INDICAÇÃO**

A bomba Remunity para injeção de Remodulin (treprostinil) destina-se à administração via subcutânea contínua de injeção de Remodulin (treprostinil) para uso em adultos (maior que 22 anos de idade).

## **INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA A COMUNIDADE**

### **Advertências e precauções**

Não use o sistema fora das condições listadas no Guia do Usuário. Guarde o Manual do usuário para referência futura. Consulte o Manual do usuário para todas as advertências e precauções. O não cumprimento das seguintes advertências e precauções pode resultar em danos.

Limitado ao uso com Remodulin. Apenas cassetes de Remunity podem ser usados com a bomba Remunity. A bomba Remunity destina-se apenas ao uso com conjuntos de infusão liberados pela FDA: Medtronic Quick-set Infusion Set (MMT-392, MMT-393), Medtronic Silhouette Infusion Set (MMT-373) e Smiths Medical Cleo 90 Infusion Set (21-7230-24, 21-7220-24).

Não use descartáveis de embalagens estéreis previamente abertas ou danificadas, componentes descartáveis danificados ou componentes estéreis vencidos. Interrompa o uso do controle remoto e mude para o controle remoto sobressalente caso o controle remoto não funcione. O uso de cabos, baterias e carregadores de baterias diferentes dos fornecidos ou especificados pode resultar em aumento da emissão ou diminuição da imunidade do sistema de infusão da bomba Remunity. Não desconecte a bomba do cassete enquanto o cassete estiver conectado ao cateter. Evite a exposição da bomba e do cassete a temperaturas abaixo de 5 °C (41 °F) ou acima de 40 °C (104 °F). A bomba pode afetar os dispositivos elétricos e eletrônicos próximos, incluindo dispositivos médicos, celulares, dispositivos Bluetooth, leitores RFID, equipamentos Wi-Fi e campos magnéticos fortes, fazendo com que esses dispositivos operem de forma anormal ou parem de funcionar. Não abra, triture, aqueça acima de 60°C (140°F) nem incinere a bateria da bomba ou o controle remoto, pois isso pode provocar incêndio ou propagação rápida do fogo, resultando em danos. Este sistema suporta taxas de fluxo entre 16 µl/h e 225 µl/h. Se sua taxa de fluxo estiver fora dessa faixa, converse com seu médico.

### **Informações de prescrição**

Cuidado: A legislação federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo por ou a pedido de um profissional de saúde licenciado. O uso deste dispositivo sem o treinamento e supervisão de um profissional da saúde pode levar a erros que resultam em danos.

REMUISconOCT2022

**Consulte o Manual do usuário da bomba de Remunity para injeção de Remodulin (treprostinil) para obter mais informações detalhadas de segurança importantes, incluindo advertências, cuidados e instruções sobre como usar adequadamente o sistema.**

**Para obter mais informações, ligue para a United Therapeutics Corp. no telefone 1-877-864-8437.**

A bomba Remunity para injeção de Remodulin (treprostinil) é fabricada pela United Therapeutics Corp.

Você pode relatar efeitos colaterais à FDA em [www.fda.gov/MedWatch](http://www.fda.gov/MedWatch) ou ligar para 1-800-FDA-1088.

## Remodulin® (treprostinil) Injeção

### INDICAÇÃO OU O QUE É O REMODULIN?

Remodulin é um medicamento de receita usado para tratar adultos com hipertensão arterial pulmonar (HAP; Grupo 1 da OMS), que é a alta pressão arterial nas artérias de seus pulmões. Remodulin pode reduzir os sintomas associados ao exercício. O Remodulin foi estudado principalmente em pacientes com sintomas de classe funcional II-IV da Associação de Cardiologia de Nova Iorque (NYHA, New York Heart Association). Não se sabe se o Remodulin é seguro e eficaz em crianças. Em pessoas com HAP que precisam mudar do epoprostenol, o Remodulin é aprovado para retardar a piora dos sintomas.

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES SOBRE O Remodulin

**Antes de tomar o Remodulin, informe seu profissional da saúde se você:**

- Ter outras condições médicas ou tomar outros medicamentos que possam afetar seu uso de Remodulin, aumentando o risco de efeitos colaterais ou diminuindo a eficácia do medicamento.
- Tem problemas no fígado ou rins. Sua dose de Remodulin pode precisar ser ajustada se você tiver problemas hepáticos.
- Tem pressão arterial baixa ou problemas de sangramento.
- Está tomando gemfibrozil (para colesterol alto), rifampicina (para infecção) ou outros medicamentos que afetam as enzimas hepáticas. Seu médico pode precisar ajustar sua dose de Remodulin.
- Estiver grávida, amamentando ou planejando engravidar. Não se sabe se o Remodulin prejudicará seu bebê que ainda não nasceu ou se o Remodulin é transferido para o leite materno.

#### Quais são os efeitos colaterais sérios do Remodulin?

- Infusões intravenosas (IV) contínuas de Remodulin administradas usando uma bomba de infusão externa, com um tubo colocado em uma veia central dentro do tórax, estão associadas ao risco de infecções na corrente sanguínea e sepsis, que podem ser fatais. Portanto, a infusão subcutânea (SC) contínua administrada logo abaixo da pele é o tipo preferido de administração.
- Piora dos sintomas da HAP. Não pare de tomar nem reduza muito sua dose de Remodulin sem consultar seu médico.
- Pressão arterial baixa (hipotensão sintomática). Se você tiver pressão arterial baixa ou estiver tomando medicamentos que diminuam sua pressão arterial, o risco de pressão arterial baixa aumenta.
- Problemas de sangramento. Remodulin pode aumentar o risco de sangramento em pessoas que tomam anticoagulantes (anticoagulantes).

#### Quais são os possíveis efeitos colaterais de Remodulin?

- Em estudos clínicos da infusão via SC de Remodulin, a maioria das pessoas apresentou dor no local da infusão e reação no local da infusão (vermelhidão, inchaço e erupção cutânea). Esses sintomas foram, às vezes, graves e, às vezes, exigiram tratamento com narcóticos ou descontinuação de Remodulin.
- A infusão IV de Remodulin administrada por meio de uma bomba externa foi associada ao risco de infecções na corrente sanguínea, inchaço no braço, sensação de formigamento, hematoma e dor.
- Os efeitos colaterais mais comuns observados com o Remodulin via SC ou IV foram cefaleia, diarreia, náusea, erupção cutânea, dor na mandíbula, alargamento dos vasos sanguíneos (vasodilatação) e inchaço devido à retenção de líquidos (edema). Estes não são todos os efeitos colaterais possíveis do Remodulin. Ligue para o seu médico para obter orientação médica sobre efeitos colaterais.

Você pode relatar efeitos colaterais à FDA em [www.fda.gov/MedWatch](http://www.fda.gov/MedWatch) ou ligar para 1-800-FDA-1088.

As informações de risco fornecidas aqui não são abrangentes. Para saber mais sobre o Remodulin, converse com seu profissional da saúde. Consulte as informações completas de prescrição em [www.Remodulin.com](http://www.Remodulin.com) ou ligue para o serviço de atendimento ao cliente em 1-877-UNITHER (1-877-864-8437).

REMISIconMAY2021



# Porque você tem mais a viver

Como a terapia de bomba mais prescrita para HAP, o Remodulin possibilita que pessoas como você avancem com um tratamento para ajudá-lo a permanecer ativo em sua vida diária.

- ✓ **Demonstrado para lhe ajudar a se sentir e a funcionar melhor**
- ✓ **Uma escolha de opções de bomba que pode atender às suas próprias necessidades pessoais**
- ✓ **Suporte disponível que pode ajudá-lo a começar e continuar o tratamento**

Lembre-se, muitas pessoas incorporaram com sucesso o Remodulin em suas vidas diárias, **e estamos confiantes de que você também pode.**

Visite [Remodulin.com](https://www.Remodulin.com) para saber mais sobre a vida com HAP e Remodulin, ouvir pacientes reais em terapia e inscrever-se para obter apoio adicional.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES SOBRE Remodulin (CONTINUAÇÃO)

### Quais são os possíveis efeitos colaterais de Remodulin?

- Em estudos clínicos da infusão via SC de Remodulin, a maioria das pessoas apresentou dor no local da infusão e reação no local da infusão (vermelhidão, inchaço e erupção cutânea). Esses sintomas foram, às vezes, graves e, às vezes, exigiram tratamento com narcóticos ou descontinuação de Remodulin.
- A infusão IV de Remodulin administrada por meio de uma bomba externa foi associada ao risco de infecções na corrente sanguínea, inchaço no braço, sensação de formigamento, hematoma e dor.
- Os efeitos colaterais mais comuns observados com o Remodulin via SC ou IV foram cefaleia, diarreia, náusea, erupção cutânea, dor na mandíbula, alargamento dos vasos sanguíneos (vasodilatação) e inchaço devido à retenção de líquidos (edema). Estes não são todos os efeitos colaterais possíveis do Remodulin. Ligue para o seu médico para obter orientação médica sobre efeitos colaterais.

Consulte as informações de segurança importantes completas nas páginas 10 e 11 e as informações de prescrição completas e informações ao paciente no encarte.

**REMODULIN**<sup>®</sup>  
(treprostinil) Injection  
Experience • Innovation • Support



Remodulin and Remunity são marcas registradas da United Therapeutics Corporation. Todas as outras marcas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Os fabricantes dessas marcas não são afiliados e não endossam a United Therapeutics ou seus produtos.

© 2023 United Therapeutics Corporation. Todos os direitos reservados. US/REM/0868 Impresso nos EUA.