

Quando os sintomas
da HAP fazem você
perder as atividades
diárias...

VIVA MAIS

dias bons

COM ORENITRAM

A adição de Orenitram comprovadamente retarda a progressão da HAP e pode ajudar a melhorar os sintomas — para ajudá-lo a fazer mais e ajudar a controlar sua HAP

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

Quem não deve tomar Orenitram?

Não tome Orenitram se você tiver problemas hepáticos graves.

Consulte as informações de segurança importantes completas em **todo este folheto** e as informações completas de



orenitram[®]
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

**prescrição e informações ao paciente do Orenitram em
www.orenitram.com.**

HAP = hipertensão arterial pulmonar.

**A HAP pode fazer com que você
perca os bons dias que deseja
aproveitar...**

É hora de considerar adicionar o Orenitram?

Sintomas de HAP, como falta de ar ou sensação de cansaço podem significar que você não consegue fazer tantas atividades em sua vida diária. Como a HAP é uma doença progressiva, você pode se tornar menos ativo ao longo do tempo.

Com Orenitram, você pode ser capaz de fazer mais coisas que importam para você

Seu medicamento atual para HAP pode estar ajudando seus sintomas, mas você deve saber que pode haver mais coisas que você pode fazer.

Foi comprovado que o orenitram retarda a progressão da HAP e pode ajudar a melhorar os sintomas.

Agora é a hora de trabalhar com seu profissional da saúde para determinar se o Orenitram é adequado para você.

O que é Orenitram?

Orenitram é um medicamento de receita usado para tratar hipertensão arterial pulmonar (HAP), que é a alta pressão arterial nas artérias de seus pulmões.

Orenitram pode ajudar a retardar a progressão da sua doença e melhorar sua capacidade de praticar exercícios. Não se sabe se Orenitram é seguro e eficaz em crianças.

Minha distância de caminhada de 6 minutos não estava melhorando. Meu médico recomendou iniciar o Orenitram para me ajudar a fazer mais atividades e me sentir melhor na minha vida diária.

— Angelie, uma paciente de Orenitram


orenitram®
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

O que devo dizer ao meu profissional da saúde antes de tomar Orenitram?

Informe seu profissional da saúde:

- Se você tiver problemas hepáticos ou diverticulose.

Consulte as informações de segurança importantes completas em todo este folheto e as informações de prescrição completas informações ao paciente do Orenitram em www.orenitram.com.

Como Orenitram funciona?

Orenitram é um medicamento oral que funciona de forma diferente de outros medicamentos orais que você já pode estar tomando para HAP. É por isso que adicioná-lo ao seu plano de tratamento pode ser um próximo passo importante para ajudá-lo a fazer mais e ajudar a controlar sua HAP.

A HAP afeta três substâncias no corpo

Os sintomas da HAP podem ocorrer quando os vasos sanguíneos dentro dos pulmões ficam estreitos, dificultando o fluxo do sangue. Acredita-se que essas alterações sejam causadas por desequilíbrios de substâncias naturais em três vias do seu corpo. Existem medicamentos que tratam cada uma dessas três vias.

ÓXIDO NÍTRICO

Dependendo de qual via você estiver tratando, pode

ENDOTELINA

PROSTACICLINA

haver mais coisas que você possa fazer. **Adicionar Orenitram pode ajudar a garantir que você não perca o tratamento da via da prostaciclina.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

O que devo dizer ao meu profissional da saúde antes de tomar Orenitram? (cont.)

Informe seu profissional da saúde:

- Se você estiver grávida, amamentando e/ou planeja engravidar ou amamentar. Não se sabe se Orenitram vai prejudicar seu bebê que ainda não nasceu ou se Orenitram passa para o leite materno. Converse com seu profissional da saúde sobre a melhor maneira de alimentar seu bebê durante o tratamento com Orenitram.

Por que a via da prostaciclina é importante?

Quando você tem HAP, seu corpo pode não produzir prostaciclina suficiente, uma substância natural que mantém seus vasos sanguíneos abertos e funcionando adequadamente.



O Orenitram imita os efeitos da prostaciclina natural, ajudando a abrir os vasos sanguíneos para que seja mais fácil para seu coração bombear sangue pelos pulmões.


orenitram[®]
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

O orenitram ajuda a substituir a prostaciclina natural que pode estar faltando.

Converse com seu profissional da saúde para ver se Orenitram pode ajudá-lo a atingir suas metas de tratamento para que você possa começar a *aproveitar mais dias bons*.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

O que devo dizer ao meu profissional da saúde antes de tomar Orenitram? (cont.)

Informe seu profissional da saúde:

- **Sobre todos os medicamentos que você usa**, incluindo receitas de medicamentos e de venda livre, vitaminas e suplementos fitoterápicos. O Orenitram e outros medicamentos podem afetar uns aos outros, causando efeitos colaterais. Não inicie nenhum medicamento novo até verificar com seu profissional da saúde. Informe seu profissional da saúde especialmente se você tomar outro medicamento que contenha treprostínil, como Remodulin® ou Tyvaso®.

Consulte as informações de segurança importantes completas em todo este folheto e as informações de prescrição completaseinformações ao paciente do Orenitram em www.orenitram.com.

Orenitram, lhe ajudando a aproveitar mais dias bons

O orenitram é a forma em comprimidos do mesmo tipo comprovado e confiável de medicamento que está disponível como terapia com bomba há mais de 18 anos. Adicionar Orenitram pode ajudá-lo a fazer mais e ajudar a controlar sua HAP.

Comprovado que retarda a progressão da doença

Em um estudo clínico, os pacientes que adicionaram Orenitram foram...

61% MENOS PROVÁVEL

**O PROGRESSO DA HAP AO LONGO DO TEMPO EM
COMPARAÇÃO COM AQUELES QUE NÃO USAM
ORENITRAM***

*Em um estudo clínico que incluiu 690 pacientes que estavam tomando um único medicamento oral para HAP (PDE-5i, sGCS ou ERA). No início do estudo, esses pacientes adicionaram Orenitram ou placebo ao seu tratamento.

† Em um estudo clínico que incluiu 349 pacientes que não estavam recebendo nenhuma terapia para HAP. No início do estudo, esses pacientes começaram a tomar Orenitram ou placebo.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

Como devo tomar Orenitram?

- Não altere sua dose nem pare de tomar Orenitram de repente sem primeiro falar com seu profissional da saúde.

ERA = antagonista do receptor de endotelina; PDE-5i = inibidor da fosfodiesterase tipo 5; sGCS = estimulador solúvel da guanilato ciclase.

Orenitram pode ajudar você a fazer mais e ajudar a controlar sua HAP


Em estudos clínicos, a adição de Orenitram ajudou os pacientes a melhorar de várias maneiras:



orenitram[®]
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS




9 em cada 10 pacientes melhoraram ou mantiveram sua capacidade de realizar mais atividades diárias com menos sintomas, conforme medido pela classe funcional*



Redução do esforço no coração, o que significa que o coração não precisa trabalhar tanto para bombear sangue para os pulmões*

Em apenas
3 MESES



Diminuição da falta de ar durante as atividades diárias*



Aumentaram a capacidade de caminhar mais, conforme medido pelo teste de distância de caminhada de 6 minutos[†]

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

Como devo tomar Orenitram? (cont.)

- Orenitram geralmente é tomado 3 vezes ao dia (aproximadamente a cada 8 horas) ou 2 vezes ao dia (aproximadamente a cada 12 horas). Seu profissional da saúde lhe dirá com que frequência você deve tomar Orenitram. Se você apresentar efeitos colaterais, seu profissional da saúde pode lhe dizer para alterar sua dose ou quando você toma Orenitram. Tome Orenitram com alimentos.

Consulte as informações de segurança importantes completas em todo este folheto e as informações de prescrição completas e informações ao paciente do Orenitram em

www.orenitram.com.

Orenitram pode ajudar a melhorar sua situação de risco*

9 DE 10

MELHORARAM OU MANTIVERAM

Os pacientes que tomaram Orenitram melhoraram ou mantiveram sua situação de risco, e a melhora foi observada já em três meses. Na verdade, mais de 30% dos pacientes melhoraram e conseguiram manter a melhora até a semana 60.

Por que a situação de risco é importante?

Seu profissional da saúde pode usar a situação de risco para tomar decisões sobre seu tratamento. Isso os ajuda a determinar como você está se saindo hoje e a prever como você vai se saindo no futuro.

Inicie a conversa

Encontre um guia de discussão útil no final deste folheto, com perguntas que você pode fazer ao seu profissional da saúde sobre como adicionar Orenitram ao seu tratamento. Preencha-o e traga-o com você na sua próxima visita.

*Em um estudo clínico que incluiu 690 pacientes que estavam tomando um único medicamento oral para HAP (PDE-5i, sGCS ou ERA). No início do estudo, esses pacientes adicionaram Orenitram ou placebo ao seu tratamento.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

Como devo tomar Orenitram? (cont.)

- Ingerir os comprimidos de Orenitram inteiros. Não rache, mastigue, triture ou quebre os comprimidos de Orenitram. Não tome



orenitram[®]
treprostinil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

comprimidos de Orenitram danificados ou quebrados. **Se os comprimidos de Orenitram não forem tomados inteiros, eles podem liberar medicamentos demais de uma vez. Isso pode levar a efeitos colaterais.**

- Se você esquecer sua dose de Orenitram, tome a dose esquecida assim que possível com alimentos.

Com Orenitram, consigo planejar mais e criar melhores memórias. Posso compartilhar até mesmo coisas simples, como cozinhar ou rir, com minha família e amigos.

— *Angelic, uma paciente de Orenitram*

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

Como devo tomar Orenitram? (cont.)

- Se você perder duas ou mais doses de Orenitram, ligue para o seu profissional da saúde para ver se você precisa alterar a sua dose.
- Se você tomar Orenitram em excesso, ligue para o seu profissional da saúde ou vá ao pronto-socorro hospitalar mais próximo imediatamente.

Consulte as informações de segurança importantes completas em todo este folheto e as informações de prescrição completaseinformações ao paciente do Orenitram em www.orenitram.com.

Introdução ao Orenitram

Como outros medicamentos que você pode estar tomando, Orenitram é um comprimido oral. Orenitram é tomado com alimentos, geralmente 3 vezes ao dia (a cada 8 horas).*



8 HORAS



8 HORAS




Seu profissional da saúde lhe dirá exatamente como tomar Orenitram e, juntos, você pode criar um plano que se encaixe em sua vida diária.

Dose personalizada

Como a HAP é uma doença progressiva, suas necessidades de tratamento podem mudar ao longo do tempo. Com Orenitram, você pode não ter que começar a tomar um novo medicamento. Seu profissional da saúde pode continuar a aumentar ou alterar sua dose para atender às suas necessidades, para que você possa continuar com Orenitram por um longo prazo para ajudar a controlar sua HAP.[†]


orenitram[®]
treprostiniil
EXTENDED-RELEASE TABLETS

O orenitram está disponível em 5 potências de comprimido, facilitando o ajuste da dose para o seu profissional da saúde.



Disponível em 5 potências de comprimidos

Não mostrado no tamanho real.

*O orenitram também pode ser tomado duas vezes ao dia (a cada 12 horas). A potência do comprimido pode ser aumentada dependendo de quão bem você tolera o tratamento.

† Não há dose máxima de Orenitram, para que seu profissional da saúde possa continuar a aumentar sua dose, desde que você possa tolerar o medicamento.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

Como devo tomar Orenitram? (cont.)

- Você pode ver o invólucro do comprimido nas fezes (movimentos intestinais). Isso geralmente é normal. O invólucro do comprimido não é digerido. Se você tiver diverticulose, o revestimento do comprimido pode ficar preso em uma bolsa oculta ou divertículo no intestino.

Saber o que esperar do tratamento

Orenitram pode causar efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns de Orenitram incluem dor de cabeça, diarreia, náusea, vômito, rubor e dor nos braços, pernas e mandíbula.

Seu profissional da saúde conversará com você sobre os possíveis efeitos colaterais para que você possa se sentir preparado e planejar com antecedência para ajudar a lidar com eles.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

Quais são os possíveis efeitos colaterais de Orenitram?

Orenitram pode causar efeitos colaterais graves, incluindo piora dos sintomas da HAP.

- Parar de repente o Orenitram pode causar piora dos seus sintomas de HAP. **Não altere sua dose nem pare de tomar Orenitram de repente sem primeiro falar com seu profissional da saúde.**

Consulte as informações de segurança importantes completas em todo este folheto e as informações de prescrição completas e informações ao paciente do Orenitram em www.orenitram.com.

Apoio desde o início

Se você e seu profissional da saúde decidirem que o Orenitram pode ajudá-lo a atingir suas metas de tratamento, a United Therapeutics, a fabricante do Orenitram, fornece apoio em cada etapa do processo.

Assistência de uma farmácia especializada

Quando você toma Orenitram, você não o recebe de sua farmácia local. A United Therapeutics trabalha com farmácias especializadas (FE) especializadas em HAP para fornecer seu medicamento.

Sua FE ajudará você em cada etapa do seu tratamento com Orenitram, como:

- agendar visitas de enfermagem para começar o tratamento
- oferecer assistência contínua por meio de visitas presenciais ou virtuais e suporte telefônico 24 horas
- coordenar a entrega do seu medicamento





A ASSIST é uma equipe da United Therapeutics comprometida em ajudá-lo com sua prescrição, desde responder a perguntas sobre sua prescrição até explicar sua cobertura de seguro e muito mais. Para saber mais, visite www.orenitram.com.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

Quais são os possíveis efeitos colaterais de Orenitram? (cont.)

- Os efeitos colaterais mais comuns de Orenitram incluem dor de cabeça, diarreia, náusea, vômito, rubor e dor nos braços, pernas e mandíbula. Estes não são todos os efeitos colaterais possíveis de Orenitram. Informe seu profissional da saúde se você apresentar algum efeito colateral que o incomode ou não passe.

GUIA DE DISCUSSÃO

Conversando com seu profissional da saúde sobre Orenitram



US\$ 5 POR CO-PAY

Economias de custo

Com o nosso programa de copagamento, os pacientes elegíveis podem pagar apenas US\$ 5 por prescrição de Orenitram.* Saiba mais



Conexão de Orenitram

Para saber mais sobre como adicionar Orenitram ao seu plano de tratamento da HAP, junte-se ao Orenitram Connect. Com este programa, você receberá boletins informativos eletrônicos, informações úteis e

em www.UTcopy.com.

outras ferramentas úteis. Inscreva-se em www.orenitram.com.

***PARA SE INSCREVER NESTE PROGRAMA, VOCÊ DEVE ENTENDER E CONCORDAR EM CUMPRIR OS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE E OS TERMOS DE USO.**

Os requisitos de elegibilidade para este programa são: os pacientes devem ter 18 anos de idade ou mais para usar este programa. o programa é válido apenas para pacientes com seguro comercial (também conhecido como privado) que estejam tomando o medicamento para uma indicação aprovada pela FDA. pacientes que usam Medicare, Medicaid ou qualquer outro programa governamental estadual ou federal para pagar seus medicamentos não são elegíveis. os pacientes que começarem a utilizar cobertura governamental durante a vigência do Programa não serão mais elegíveis. os pacientes elegíveis devem ser residentes dos Estados Unidos ou de Porto Rico.

Para detalhes completos do programa e Termos e Condições, visite www.UTcopy.com.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

Quais são os possíveis efeitos colaterais de Orenitram? (cont.)

- Ligue para seu profissional da saúde para obter orientação médica sobre efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos colaterais à FDA em www.fda.gov/MedWatch ou ligar para 1-800-FDA-1088.

Consulte as informações de segurança importantes completas em todo este folheto e as informações de prescrição completaseinformações ao paciente do Orenitram em www.orenitram.com.



Aproveite mais dias bons com Orenitram

Orenitram pode ser exatamente o que você precisa para atingir suas metas de tratamento

- Orenitram comprovadamente retarda a progressão da HAP e pode ajudar a reduzir os sintomas que podem afetar sua vida diária
- Dose personalizada significa que você pode permanecer com Orenitram por um longo prazo para ajudar a controlar sua HAP*
- A United Therapeutics oferece apoio durante toda a sua jornada de tratamento com Orenitram

*Não há dose máxima de Orenitram, para que seu profissional da saúde possa continuar a aumentar sua dose, desde que você possa tolerar o medicamento.

Pergunte ao seu médico se adicionar Orenitram pode lhe ajudar a fazer mais e ajudar a controlar sua HAP.

Para saber mais sobre Orenitram, visite www.orenitram.com.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES para Orenitram

As informações de risco fornecidas aqui não são abrangentes. Para saber mais sobre Orenitram, converse com seu profissional da saúde. Consulte as informações completas de prescrição e informações ao paciente em www.orenitram.com ou ligue para o serviço de atendimento ao cliente em 1-877-UNITHER (1-877-864-8437).

OREISIconOCT19

Consulte as informações de segurança importantes completas em todo este folheto e as informações completas de prescrição e informações ao paciente do Orenitram em



www.orenitram.com.

Orenitram é uma marca registrada da United Therapeutics Corporation.

© 2020 United Therapeutics Corporation. Todos os direitos reservados.

US-ORE-0725

GUIA DE DISCUSSÃO

Conversando com seu profissional da saúde sobre Orenitram

Sua equipe de saúde é sua melhor fonte de informações sobre suas opções de tratamento. Ter discussões abertas e honestas com eles sobre suas metas de tratamento pode ajudar a determinar se o Orenitram pode ser adequado para você. Abaixo estão incluídas algumas coisas para pensar e perguntas que você pode fazer sobre como adicionar Orenitram ao seu plano de tratamento.

Primeiro, pense se você está aproveitando ao máximo seu tratamento atual e se pode ser hora de fazer mais para ajudá-lo a se sentir melhor.

Preencha ou anote quais são suas metas de tratamento e seu futuro (por exemplo, tirar férias com a família ou poder fazer mais tarefas diárias):



orenitram[®]
treprostinil

EXTENDED-RELEASE TABLETS

Em seguida, faça ao seu profissional da saúde as seguintes perguntas e preencha ou anote as respostas:

Como o Orenitram pode me ajudar a atingir meus objetivos de tratamento?

Como Orenitram pode ajudar a melhorar meus sintomas?

Como o Orenitram é diferente do meu medicamento atual?

O que posso esperar do tratamento?

Converse com seu profissional da saúde para ver se Orenitram é adequado para você.