

La solution pour inhalation TYVASO® (tréprostinil) et la poudre pour inhalation TYVASO DPI™ (tréprostinil) sont approuvées pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP; groupe 1 de l'OMS) afin d'améliorer la capacité à faire de l'exercice.

LES PETITS MOMENTS DE LA VIE.

VIVEZ-LES AVEC UN NOUVEAU SOUFFLE
GRÂCE À TYVASO

Ce que vous devez savoir sur
TYVASO pour l'HTAP

TYVASO EST À LA HAUTEUR

Renseignements importants sur la sûreté

Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous :


- Avez une faible tension artérielle;
- Avez ou avez eu des problèmes de saignement.

Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et à la page 15, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.

À propos de votre traitement pour l'HTAP

Les personnes atteintes d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) présentent un déséquilibre de trois substances naturelles, ce qui cause le rétrécissement des vaisseaux sanguins dans leurs poumons. Lorsque ces trois substances sont déséquilibrées, il est plus difficile de maintenir la circulation du sang dans les poumons et cela provoque des symptômes d'HTAP.

Il existe des médicaments qui traitent chacun de ces trois déséquilibres, ou voies, associés à l'HTAP. Chaque médicament pour l'HTAP ne cible qu'une seule de ces voies.



Qu'est-ce que la prostacycline? [pros-ta-si-cline]

La prostacycline est l'une des voies associées à l'HTAP. La prostacycline aide à assurer que les vaisseaux sanguins sont en bonne santé et restent ouverts. Les personnes atteintes d'HTAP peuvent ne pas produire suffisamment de prostacycline dans leurs poumons.

TYVASO aide à remplacer la prostacycline naturelle dont vous pourriez manquer.

TYVASO reproduit certains des effets de la prostacycline naturelle, ce qui aide à ouvrir les vaisseaux sanguins et à maintenir la circulation sanguine dans vos poumons.

Que sont TYVASO et TYVASO DPI?

La solution pour inhalation TYVASO (tréprostinil) et la poudre pour inhalation TYVASO DPI (tréprostinil) sont des médicaments d'ordonnance utilisés chez les adultes pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP; groupe 1 de l'OMS), qui est une tension artérielle élevée dans les artères de vos poumons. TYVASO ou TYVASO DPI peut améliorer la capacité à faire de l'exercice. Votre capacité à faire de l'exercice diminue 4 heures après la prise de TYVASO ou de TYVASO



DPI. On ignore si TYVASO ou TYVASO DPI est sûr et efficace chez les enfants de moins de 18 ans.

Inspirez-le...

TYVASO est inhalé directement dans les poumons

TYVASO permet
d'administrer
rapidement le
médicament à
l'endroit de la maladie,
là où cela est
nécessaire.

Renseignements importants sur la sûreté

Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous (suite) :

- Êtes atteint d'asthme ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC);
- Êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ne sait pas si l'un ou l'autre des produits pourrait nuire à votre enfant à naître;
- Allaites ou prévoyez allaiter. On ignore si l'un ou l'autre des produits passe dans le lait maternel. Discutez avec votre professionnel de la santé de la meilleure façon de nourrir votre bébé pendant le traitement.

Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et à la page 15, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.


TYVASO peut vous aider à faire

ce qui compte le plus

Marcher plus loin en 6 minutes

Dans le cadre d'une étude clinique, les personnes qui ont ajouté TYVASO à leur médicament actuel pour l'HTAP ont marché plus loin, ce qui a permis d'améliorer leur 6MWD* en seulement **6 semaines†**.

Lors d'un test de marche de 6 minutes, les gens ont pu marcher :



Distance après 12 semaines de traitement (6MWD)

Faites-en plus durant votre journée

Lorsque vous ajoutez TYVASO à votre traitement actuel, vous pourriez être en mesure de faire des choses comme :



* La distance de marche pendant 6 minutes (6MWD) est un test pour savoir jusqu'où vous pouvez marcher en 6 minutes.

† Dans l'étude clinique de 12 semaines sur TYVASO, les personnes prenant un médicament oral pour l'HTAP (bosentan ou sildénafil) ont passé un test de marche de 6 minutes au début et à la fin de l'étude.

Renseignements importants sur la sûreté

Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sous ordonnance et en vente libre, les vitamines et les suppléments à base de plantes. Les deux produits peuvent interagir avec d'autres médicaments.

TYVASO DPI
(treprostini) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostini) INHALATION
SOLUTION

Poursuivre l'étude

Après la fin de l'étude clinique d'une durée de 12 semaines, les patients qui ont reçu TYVASO ont pu continuer à le prendre et les patients qui avaient initialement reçu le placebo ont pu commencer à prendre TYVASO.

Presque tous les patients qui ont terminé l'étude initiale (97 %) ont décidé de continuer à participer dans le cadre de l'étude de suivi à long terme.

Pendant cette étude, les chercheurs ont suivi les patients pour comprendre la posologie et la sûreté de TYVASO. Ils ont également observé les changements à leur 6MWD, leur capacité à être actifs et leur taux de survie.

Les patients qui ont pris TYVASO dans le cadre de l'étude clinique et qui ont continué à être observés...

...ONT AMÉLIORÉ

LEUR 6MWD par

34,6 m (114 pi) à

18 mois

... AVAIENT UN

TAUX DE SURVIE

de **82 %** après 3 ans

82 %

Il est important de noter que dans cette étude, tous les patients prenaient TYVASO et qu'aucune comparaison n'a été faite avec les personnes qui ne prenaient pas TYVASO. Il est donc difficile de déterminer avec certitude si ces résultats découlent de TYVASO.

Renseignements importants sur la sûreté

Informez-en tout particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez des :

- Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension ou les maladies cardiaques;
- Médicaments qui diminuent la coagulation sanguine (anticoagulants).

Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et à la page 15, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.

Vous pouvez prendre TYVASO de deux façons

TYVASO DPI

TYVASO DPI tient dans la paume de votre main

TYVASO est offert en **inhalateur à poudre sèche** (Dry Powder Inhaler, **DPI**).

Cet inhalateur **petit et portable** utilise des cartouches et est conçu pour une **utilisation facile**.

- Facilement **portable**
- **Cartouches à dose unique** préremplies de médicament
- Une seule inspiration par cartouche, **4 fois par jour**

Prendre une dose est aussi simple que : UNE SEULE INSPIRATION — OUVRIR, CHARGER, INHALER

98 % **Taux de satisfaction des patients de 98 %** avec TYVASO DPI

TYVASO DPI a reçu des niveaux de satisfaction élevés de 45 personnes sur 46 participant à une étude clinique qui sont passées du nébuliseur TYVASO*.

* Dans l'étude clinique, 51 personnes atteintes d'HTAP qui ont utilisé le nébuliseur TYVASO durant au moins 3 mois sont passées à TYVASO DPI. Les chercheurs ont consigné les effets secondaires, et après 3 semaines, 46 patients ont évalué leur satisfaction à l'égard de TYVASO DPI dans un questionnaire.

Pour plus de détails sur la façon d'utiliser TYVASO DPI, rendez-vous au www.helloTYVASODPI.com.

Renseignements importants sur la sûreté

Prévenez tout particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez l'un des suivants (suite) :

- Diurétiques
- Gemfibrozil (Lopid®) ou rifampine (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)

Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et à la page 15, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION POWDER


TYVASO
(treprostinil) INHALATION SOLUTION

Posologie pour TYVASO DPI et atteindre votre dose d'entretien cible

Votre médecin collaborera avec vous pour augmenter votre dose jusqu'à ce que vous atteigniez votre dose d'entretien cible. Ce processus s'appelle « titrage ».

Prévoyez de prendre votre médicament environ **toutes les 4 heures en situation d'éveil**.

- Les doses sont prises en **une (1) inspiration** par cartouche
- La plupart des personnes commencent par la **cartouche de 16 mcg, 4 fois par jour**, et **augmentent** leur dose **toutes les 1 à 2 semaines** jusqu'à ce qu'elles atteignent leur dose d'entretien cible



Renseignements importants sur la sûreté

Quels sont les effets secondaires possibles de TYVASO ou TYVASO DPI?

Les deux produits peuvent causer des **effets secondaires graves**, y compris :

- **Faible tension artérielle** (hypotension symptomatique). Si vous avez une faible tension artérielle, les deux produits peuvent abaisser votre tension artérielle davantage.
- **Problèmes de saignement**. Les deux produits peuvent augmenter le risque de saignement, en particulier chez les personnes qui prennent des anticoagulants.

Vous pouvez prendre TYVASO de deux façons

Nébuliseur TYVASO

Le nébuliseur TYVASO s'adapte à votre journée

Ce **nébuliseur portatif** permet d'administrer le médicament à la maison ou en déplacement.

Une façon simple de se
rappeler : Comptez jusqu'à 4 et
ajoutez-en 1

- 1 Configurer l'appareil **1 fois chaque matin**
- 2-3 Chaque séance dure environ **2 à 3 minutes**.
- 4 Prendre TYVASO **4 fois par jour** pendant les heures d'éveil
- +1 Nettoyer le dispositif **1 fois chaque soir**

Pour plus de détails sur l'utilisation du nébuliseur TYVASO, rendez-vous au www.helloTYVASOnebulizer.com.

Renseignements importants sur la sûreté

Quels sont les effets secondaires possibles de TYVASO ou de TYVASO DPI? (suite) Les effets secondaires les plus courants des deux produits sont la toux, les maux de tête, l'irritation et la douleur à la gorge, les nausées, la rougeur du visage et du cou (bouffées vasomotrices), l'évanouissement ou la perte de conscience, les étourdissements, la diarrhée et l'essoufflement. Comme avec les autres prostaglandines inhalées, vous pourriez avoir de la difficulté à respirer après avoir pris TYVASO ou TYVASO DPI car cela peut causer un resserrement des muscles autour des voies respiratoires (bronchospasme). Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires ou si vous avez de la difficulté à respirer.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

Posologie avec le nébuliseur TYVASO et atteindre votre dose d'entretien cible

Avec le nébuliseur TYVASO, chaque séance de traitement prend environ 2 à 3 minutes.



Votre médecin collaborera avec vous pour augmenter le nombre d'inspirations par séance chaque semaine, jusqu'à ce que vous atteigniez la dose d'entretien cible.

- La dose d'entretien cible est de **9 à 12 inspirations, 4 fois par jour**
- Il a fallu en moyenne **3 semaines** aux patients de l'étude clinique pour atteindre leur **dose cible**

Renseignements importants sur la sûreté

Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous :

- Avez une faible tension artérielle;
- Avez ou avez eu des problèmes de saignement.

Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et à la page 15, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.

Atteindre votre dose d'entretien cible pour maximiser les bienfaits

Votre médecin collaborera avec vous pour atteindre votre dose d'entretien cible, ce qui est important pour que vous profitiez pleinement du médicament.

À quoi s'attendre lors du titrage

- Lorsque vous augmentez votre dose chaque semaine, vous pourriez présenter des effets secondaires
- Parlez au personnel infirmier ou à votre médecin pour vous aider à prendre en charge les effets secondaires
- Ne cessez pas de prendre TYVASO sans en parler d'abord à votre professionnel de la santé

TYVASO s'intègre à votre routine quotidienne



Réveil



Dîner



Souper



Au coucher

Renseignements importants sur la sûreté

Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous (suite) :

- Êtes atteint d'asthme ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC);
- Êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ne sait pas si l'un ou l'autre des produits pourrait nuire à votre enfant à naître;
- Allaites ou prévoyez allaiter. On ignore si l'un ou l'autre des produits passe dans le lait maternel. Discutez avec votre professionnel de la santé de la meilleure façon de nourrir votre bébé pendant le traitement.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

Assurez-vous de prendre TYVASO
4 fois par jour selon les directives
de votre médecin.

Vous pourriez présenter des effets secondaires...

Ne laissez pas les effets secondaires vous empêcher de profiter des bienfaits de votre médicament. Il est important de parler à votre professionnel de la santé et de continuer à prendre TYVASO, sauf si on vous indique d'arrêter. Assurez-vous de communiquer avec le personnel infirmier pour savoir ce que vous pouvez faire pour aider à prendre en charge les effets secondaires tout en poursuivant le traitement, comme :

TOUX/IRRITATION DE LA GORGE

- ✓ Revoir la technique appropriée
- ✓ Avant le traitement, buvez de l'eau très froide ou très tiède
- ✓ Au besoin, utilisez un vaporisateur pour la gorge pour engourdir votre gorge avant le traitement
- ✓ Parlez à votre professionnel de la santé pour savoir si le ralentissement du rythme auquel vous augmentez votre dose pourrait vous aider

NAUSÉES

- ✓ Rincez-vous la bouche avec de l'eau après le traitement
- ✓ Parlez à votre professionnel de la santé pour savoir si le ralentissement du rythme auquel vous augmentez votre dose pourrait vous aider

MAUX DE TÊTE

- ✓ Utilisez un analgésique en vente libre, comme l'acétaminophène; parlez à votre professionnel de la santé pour savoir si le ralentissement du rythme auquel vous augmentez votre dose pourrait vous aider

Revoyez la technique appropriée pour votre appareil dans les manuels d'instructions d'utilisation qui se trouvent dans la pochette ou au www.TYVASO.com.

Ces conseils pourraient vous aider à prendre en charge les effets secondaires courants de TYVASO, selon l'expérience du professionnel de la santé. Ils ne sont pas destinés à servir de conseils médicaux.

Renseignements importants sur la sûreté

Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sous ordonnance et en vente libre, les vitamines et les suppléments à base de plantes. Les deux produits peuvent interagir avec d'autres médicaments.

Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et à la page 15, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.

Vous offrir du soutien de nombreuses façons

Cela commence par un appel d'une pharmacie spécialisée
TYVASO n'est offert que par l'entremise de pharmacies spécialisées qui mettent l'accent sur la formation à domicile et le soutien jour et nuit. Votre fournisseur de la pharmacie spécialisée (PS) fait partie de votre équipe de soins de santé.

Que se passe-t-il ensuite : Votre fournisseur de la PS vous appellera.

Répondez à l'appel! Lorsqu'il communiquera avec vous pour la première fois, le fournisseur de la PS peut vous appeler à partir d'un numéro 866 ou 877 que vous ne reconnaissez peut-être pas. Il est important de répondre à l'appel parce qu'ils pourraient ne pas être en mesure de vous laisser un message en raison des règles de confidentialité. Puisqu'ils ne peuvent pas vous fournir le médicament s'ils ne vous parlent pas, assurez-vous de répondre à l'appel pour commencer et continuer le traitement.

Un membre du personnel infirmier de la PS vous donnera des instructions personnelles sur l'utilisation de TYVASO et vous fournira un soutien continu. Votre infirmier(ère) de la PS peut vous rendre visite ou vous appeler régulièrement pendant que vous vous habituez à utiliser TYVASO.

Renseignements importants sur la sûreté

Informez-en tout particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez des :

- Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension ou les maladies cardiaques;
- Médicaments qui diminuent la coagulation sanguine (anticoagulants).
- Diurétiques
- Gemfibrozil (Lopid®) ou rifampine (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)

Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et à la page 15, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.

TYVASO DPI
(treprostini) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostini) INHALATION
SOLUTION

\$5

QUOTE-PART



Programme d'assistance avec quote-part

Grâce au programme d'assistance avec quote-part de TYVASO, la plupart des patients admissibles paient aussi peu qu'une quote-part de 5 \$ pour chaque ordonnance de TYVASO ou de TYVASO DPI.

Apprenez comment vous inscrire au www.UTcopy.com ou appelez ASSIST au 1 877 864-8437.

Les critères d'admissibilité à ce programme sont les suivants :

- Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour utiliser ce programme.
- Les patients qui utilisent Medicare, Medicaid ou tout autre programme gouvernemental d'État ou fédéral pour payer leurs médicaments ne sont pas admissibles. Les patients qui commencent à bénéficier d'une couverture gouvernementale pendant la durée du programme ne seront plus admissibles.
- Le programme n'est offert que pour les patients ayant une assurance commerciale (aussi connue sous le nom d'assurance privée) qui prennent le médicament pour une indication approuvée par la FDA.
- Les patients admissibles doivent être des résidents des États-Unis ou de Porto Rico. Le programme est assujéti à d'autres restrictions de la loi de l'État. Les patients résidant dans certains États pourraient ne pas être admissibles au programme.

Visitez www.UTcopy.com pour obtenir tous les détails et les modalités du programme.

Commencer votre parcours thérapeutique avec TYVASO



Le programme Archways de United Therapeutics est un programme de soutien éducatif virtuel qui offre des renseignements et des ressources utiles sur la maladie pour le traitement. Archways est offert gratuitement aux patients et aux soignants lorsque vous commencez votre parcours de traitement avec TYVASO.

Pour commencer, suivez l'une de ces trois étapes simples :

- Appelez le **1 888 327-2492**
- Textez « **START** » au **882724** (*des tarifs standard de messages et de données peuvent s'appliquer*)
- Consultez le site **www.UTArchways.com**

United Therapeutics et le programme Archways ne fournissent pas de conseils médicaux. Nous vous conseillons de consulter votre professionnel de la santé si vous avez des questions ou des préoccupations spécifiques au sujet de votre traitement.

Joignez-vous aux milliers de personnes qui ont choisi le traitement par TYVASO

La décision d'ajouter TYVASO à votre vie est personnelle, mais lorsque vous et votre professionnel de la santé le faites, vous devez savoir que vous faites partie des milliers de personnes qui ont pris la même décision. En fait, TYVASO est le traitement par inhalation le plus prescrit pour l'HTAP.

Dédié à aider les personnes atteintes d'HTAP

TYVASO est produit par United Therapeutics Corporation, une société fondée en 1996 par un couple dont la fille est atteinte d'HTAP. Chez United Therapeutics, nous nous engageons à aider les personnes atteintes d'HTAP.

Renseignements importants sur la sûreté

Quels sont les effets secondaires possibles de TYVASO ou TYVASO DPI?

Les deux produits peuvent causer des **effets secondaires graves**, y compris :

- **Faible tension artérielle** (hypotension symptomatique). Si vous avez une faible tension artérielle, les deux produits peuvent abaisser votre tension artérielle davantage.
- **Problèmes de saignement**. Les deux produits peuvent augmenter le risque de saignement, en particulier chez les personnes qui prennent des anticoagulants.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

Renseignements importants sur la sûreté

Avant de prendre TYVASO ou TYVASO DPI, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si vous :

- Avez une faible tension artérielle;
- Avez ou avez eu des problèmes de saignement.
- Êtes atteint d'asthme ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC);
- Êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ne sait pas si l'un ou l'autre des produits pourrait nuire à votre enfant à naître;
- Allaites ou prévoyez allaiter. On ignore si l'un ou l'autre des produits passe dans le lait maternel. Discutez avec votre professionnel de la santé de la meilleure façon de nourrir votre bébé pendant le traitement.

Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sous ordonnance et en vente libre, les vitamines et les suppléments à base de plantes. Les deux produits peuvent interagir avec d'autres médicaments.

Informez-en tout particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez des :

- Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension ou les maladies cardiaques;
- Médicaments qui diminuent la coagulation sanguine (anticoagulants).
- Diurétiques
- Gemfibrozil (Lopid®) ou rifampine (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)

Quels sont les effets secondaires possibles de TYVASO ou TYVASO DPI?

Les deux produits peuvent causer des **effets secondaires graves**, notamment :

- **Faible tension artérielle** (hypotension symptomatique). Si vous avez une faible tension artérielle, les deux produits peuvent abaisser votre tension artérielle davantage.
- **Problèmes de saignement**. Les deux produits peuvent augmenter le risque de saignement, en particulier chez les personnes qui prennent des anticoagulants.

Les effets secondaires les plus courants des deux produits sont la toux, les maux de tête, l'irritation et la douleur de la gorge, les nausées, la rougeur du visage et du cou (bouffées vasomotrices), l'évanouissement ou la perte de conscience, les étourdissements, la diarrhée et l'essoufflement. Comme avec les autres prostaglandines inhalées, vous pourriez avoir de la difficulté à respirer après avoir pris TYVASO ou TYVASO DPI car cela peut causer un resserrement des muscles autour des voies respiratoires (bronchospasme). Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires ou si vous avez de la difficulté à respirer.

Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au

www.fda.gov/MedWatch ou appelez le **1 800 FDA-1088**.

Les renseignements sur les risques fournis ici ne sont pas complets. Pour en savoir plus sur TYVASO ou TYVASO DPI, parlez-en à votre professionnel de la santé. Veuillez consulter les renseignements posologiques complets pour **TYVASO** ou **TYVASO DPI**, les manuels d'utilisation pour le système d'inhalation **TD-100** et **TD-300** TYVASO® et la **poudre pour inhalation TYVASO DPI™**, ainsi que des renseignements supplémentaires au www.TYVASO.com ou appelez le 1 877-UNITHER (1 877 864-8437).

TYVISIconMAY2022(PAH)

Inspirez-le... Et faites de nouveau ce qui compte le plus

- ✓ TYVASO est inhalé directement dans vos poumons, ce qui permet d'administrer rapidement le médicament à l'endroit de la maladie
- ✓ Atteignez rapidement votre dose d'entretien cible
- ✓ Marchez de plus longues distances et restez plus actif avec moins de symptômes
- ✓ Prenez votre médicament à la maison ou en déplacement avec un inhalateur qui tient dans la paume de votre main ou un nébuliseur portatif sans fil
- ✓ Recevez du soutien tout au long de votre parcours thérapeutique

TYVASO EST À LA HAUTEUR

Joignez-vous au programme de soutien TYVASO

Si vous envisagez de prendre TYVASO ou si vous en prenez déjà, inscrivez-vous au programme de soutien TYVASO pour recevoir du soutien et des conseils et des ressources utiles.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui au www.TYVASO.com/pah ou à l'aide de la carte d'inscription qui se trouve dans la pochette de cette brochure.

Renseignements importants sur la sûreté

Quels sont les effets secondaires possibles de TYVASO ou de TYVASO DPI? (suite)

Les effets secondaires les plus courants des deux produits sont la toux, les maux de tête, l'irritation et la douleur de la gorge, les nausées, la rougeur du visage et du cou (bouffées vasomotrices),

TYVASO DPI™
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

l'évanouissement ou la perte de conscience, les étourdissements, la diarrhée et l'essoufflement. Comme avec les autres prostaglandines inhalées, vous pourriez avoir de la difficulté à respirer après avoir pris TYVASO ou TYVASO DPI car cela peut causer un resserrement des muscles autour des voies respiratoires (bronchospasme). Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires ou si vous avez de la difficulté à respirer.

Veillez entièrement consulter les renseignements importants sur la sûreté et à la page 15, ainsi que les renseignements posologiques complets et le mode d'emploi de TYVASO et de TYVASO DPI dans la pochette.



TYVASO est une marque déposée et TYVASO DPI est une marque de commerce de United Therapeutics Corporation.

© 2022 United Therapeutics Corporation. Tous droits réservés. US/TYV/0777 Imprimé aux É.-U.