

A solução para inalação TYVASO® (treprostinil) e o pó para inalação TYVASO DPI™ (treprostinil) são aprovados para o tratamento de hipertensão pulmonar associada com doença pulmonar intersticial (DPI-HP; Grupo 3 da OMS) para melhorar a capacidade de praticar exercícios.

# Recupere os momentos que fazem *você se movimentar*

**INSPIRE-OS COM TYVASO PARA DPI-HP**

## Informações de segurança importantes

Antes de tomar TYVASO ou TYVASO DPI, informe seu profissional da saúde sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:

- tem pressão arterial baixa
- tem ou tiver tido problemas de sangramento

Consulte as informações de segurança importantes nas páginas 20 a 21 e as informações completas de prescrição e instruções de uso anexas para TYVASO e TYVASO DPI no encarte.

DPI = inalador de pó seco; OMS = Organização Mundial de Saúde.

**TYVASO DPI™**  
(treprostinil) INHALATION POWDER

**TYVASO®**  
(treprostinil) INHALATION SOLUTION

# ENTENDENDO A DPI-HP

Um diagnóstico de DPI-HP pode parecer intimidador, mas aprender sobre sua condição e seu tratamento pode ajudá-lo a se sentir incentivado a avançar.

**DPI-HP significa hipertensão pulmonar associada com doença pulmonar intersticial**, uma doença rara, séria e progressiva. Dividir as partes do nome “DPI-HP” pode lhe dar uma boa imagem de como elas se encaixam.

## HP

Pulmonar significa que afeta os pulmões.

Hipertensão significa pressão arterial elevada.

...então, a *hipertensão pulmonar* é a pressão arterial elevada nos pulmões.

## DPI

A Doença Intersticial do Pulmão é um grupo de distúrbios pulmonares sérios e progressivos que podem danificar os pulmões e dificultar a respiração.

Alguns exemplos de DPI incluem:

- fibrose pulmonar idiopática (FPI) ou fibrose pulmonar (FP)
- fibrose pulmonar e enfisema combinados (FPEC)
- doença do tecido conjuntivo (DTC)

## Reunindo tudo

Às vezes, as pessoas com DPI também podem ter HP, e é por isso que você vê os termos reunidos em um só. Frequentemente, a HP é difícil de diagnosticar porque seus sintomas, como falta de ar, fadiga e tosse, podem parecer muito semelhantes à DPI. Nem sempre está claro que há algo mais acontecendo.


Na verdade, na FPI (que é um tipo de DPI), a HP está presente em até 15% dos pacientes nos estágios iniciais da FPI, ou mesmo no diagnóstico.

**É IMPORTANTE SER  
VERIFICADO  
REGULARMENTE,  
pois a HP pode  
aparecer a qualquer  
momento à medida  
que sua DPI progride.**

## Como a DPI progride para DPI-HP



A DPI faz com que o tecido pulmonar fique rígido, dificultando a respiração e a entrada de oxigênio no sangue.



A HP faz com que os vasos sanguíneos nos pulmões se tornem estreitos, dificultando o fluxo do sangue e fazendo com que a pressão aumente.



O coração precisa trabalhar mais para bombear sangue pelos pulmões, o que enfraquece ou danifica o coração.

# O QUE É TYVASO?

**TYVASO é o primeiro e único medicamento aprovado pela FDA para tratar DPI-HP. Isso pode aumentar sua capacidade de ser ativo.**

A DPI-HP pode ser difícil e perturbadora. Isso faz com que você se sinta cansado e sem fôlego, e você pode ter dificuldade para caminhar mais do que uma curta distância. Tratar a DPI-HP imediatamente pode ser um passo à frente que você dá à sua saúde, e pode ajudá-lo a aproveitar mais os momentos mais importantes.

## Descubra TYVASO

- ✓ Leva o medicamento diretamente aos seus pulmões, quando necessário
- ✓ Ajuda a manter os vasos sanguíneos em seus pulmões abertos para que seu coração possa bombear sangue mais facilmente
- ✓ Pode aumentar sua capacidade de ser ativo, diminuindo a chance de piora da DPI-HP

## Informações de segurança importantes

**Antes de tomar TYVASO ou TYVASO DPI, informe seu profissional da saúde sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você (continuação):**

- tem asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
- está grávida ou planeja engravidar. Não se sabe se qualquer um dos produtos prejudicará seu bebê que ainda não nasceu.
- está amamentando ou planeja amamentar. Não se sabe se qualquer um dos produtos passa para o leite materno. Converse com seu profissional da saúde sobre a melhor maneira de alimentar seu bebê durante o tratamento.

**Consulte as informações de segurança importantes nas páginas 20 a 21 e as informações completas de prescrição e instruções de uso anexas para TYVASO e TYVASO DPI no encarte.**

## Explore a diferença

Aprender sobre o TYVASO pode ajudar você a entender a diferença que ele pode fazer para sua saúde.

Continue lendo para saber como o TYVASO pode ajudar as pessoas com DPI-HP nessas principais áreas exploradas em um estudo clínico:



**A distância que você consegue caminhar**



**A quantidade de esforço no seu coração**



**O risco de piora da sua DPI-HP**

Além disso, este folheto tem informações úteis sobre possíveis efeitos colaterais e dicas que podem ajudá-lo a controlá-los.

## Informações de segurança importantes

**Fale com seu profissional da saúde sobre todos os medicamentos que você toma**, incluindo medicamentos prescritos e de venda livre, vitaminas e suplementos fitoterápicos. O produto e outros medicamentos podem afetar um ao outro.

**Informe seu profissional da saúde especialmente se você tomar:**

- medicamentos usados para tratar pressão arterial alta ou doença cardíaca
- medicamentos que diminuem a coagulação do sangue (anticoagulantes)
- Diuréticos
- Gemfibrozil (Lopid®) ou rifampina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)

**TYVASO DPI**  
(treprostinil) INHALATION  
POWDER

**TYVASO**  
(treprostinil) INHALATION  
SOLUTION

# AVANÇANDO

## O teste de caminhada de 6 minutos

A DPI-HP pode dificultar que você caminhe mais do que uma curta distância. O teste de caminhada de 6 minutos (DC6M) pode dar a você uma boa ideia sobre o quanto sua doença pulmonar pode estar afetando sua capacidade de se manter ativo.

Ele mede a distância que você consegue caminhar em 6 minutos.

**Em um estudo clínico de DPI-PH de 16 semanas, os DC6Ms foram comparados para pessoas que tomaram TYVASO e as que tomaram placebo (uma solução inalada sem medicamento).**



Após 16 semanas, as pessoas que tomaram TYVASO em um estudo clínico caminharam

**21 metros\* a mais**

em um DC6M

do que as pessoas que não tomaram TYVASO.

No final do estudo, aqueles que tomaram TYVASO melhoraram a distância que conseguiam caminhar em 6 minutos. Aqueles que tomaram placebo realmente apresentaram um declínio na distância em que conseguiram caminhar.

\*21 metros é cerca de 69 pés.

## Informações de segurança importantes

### Quais são os possíveis efeitos colaterais do TYVASO ou do TYVASO DPI?

Ambos os produtos podem causar **efeitos colaterais graves**, incluindo:

- **Pressão arterial baixa** (hipotensão sintomática). Se você tiver pressão arterial baixa, qualquer um dos produtos poderá reduzir mais sua pressão arterial.
- **Problemas de sangramento**. Qualquer um dos produtos pode aumentar o risco de sangramento, especialmente em pessoas que tomam anticoagulantes (anticoagulantes).

**Consulte as informações de segurança importantes nas páginas 20 a 21 e as informações completas de prescrição e instruções de uso anexas para TYVASO e TYVASO DPI no encarte.**

**FOI  
DEMONSTRADO  
QUE O TYVASO  
AJUDA OS  
PACIENTES COM  
HP A SEREM  
MAIS ATIVOS.**

### Informações de segurança importantes

Quais são os possíveis efeitos colaterais do TYVASO ou do TYVASO DPI? (continuação) Os efeitos colaterais mais comuns de ambos os produtos são tosse, dor de cabeça, irritação e dor na garganta, náusea, vermelhidão da face e pescoço (rubor), desmaio ou perda de consciência, tontura, diarreia e falta de ar. Como outras prostaglandinas inaladas, você pode ter dificuldade para respirar depois de tomar TYVASO ou TYVASO DPI, pois isso pode fazer com que os músculos ao redor de suas vias aéreas se contraíam (broncoespasmo). Estes não são todos os efeitos colaterais possíveis. Entre em contato com seu médico para obter orientação médica sobre efeitos colaterais ou se tiver dificuldade para respirar.

**TYVASO DPI**  
(treprostinil) INHALATION  
POWDER


**TYVASO**  
(treprostinil) INHALATION  
SOLUTION

# REDUZINDO O ESFORÇO NO CORAÇÃO

## Exame de sangue de NT-proBNP

O NT-proBNP é uma medida de tensão no coração e pode ser detectado por um exame de sangue. Seu médico pode verificar seus níveis de NT-proBNP ao longo do tempo para ver como a esforço no seu coração pode estar mudando. Se os números estiverem mais altos, haverá mais esforço no coração; se os números forem mais baixos, haverá menos esforço no coração.

**Na semana 16 do estudo clínico, os pacientes que tomaram TYVASO apresentaram menos esforço no coração (NT-proBNP diminuiu em 15%), enquanto os pacientes que tomaram placebo tiveram mais esforço no coração (NT-proBNP aumentou em 46%).**



Embora o tratamento possa afetar os resultados do teste de NT-proBNP, não se sabe quanto impacto essas alterações podem ter em sua condição.

NT-proBNP = peptídeo natriurético pró-tipo B N-terminal.

## Informações de segurança importantes

Antes de tomar TYVASO ou TYVASO DPI, informe seu profissional da saúde sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:

- tem pressão arterial baixa
- tem ou tiver tido problemas de sangramento
- tem asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)





## REDUÇÃO DA PIORA DA DOENÇA

Durante o estudo de 16 semanas, o TYVASO ajudou a reduzir o risco de piora da DPI-HP em 39%.

### Informações de segurança importantes

Antes de tomar TYVASO ou TYVASO DPI, informe seu profissional da saúde sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você (continuação):

- está grávida ou planeja engravidar. Não se sabe se qualquer um dos produtos prejudicará seu bebê que ainda não nasceu.
- está amamentando ou planeja amamentar. Não se sabe se qualquer um dos produtos passa para o leite materno. Converse com seu profissional da saúde sobre a melhor maneira de alimentar seu bebê durante o tratamento.

Consulte as informações de segurança importantes nas páginas 20 a 21 e as informações completas de prescrição e instruções de uso anexas para TYVASO e TYVASO DPI no encarte.

**TYVASO DPI**  
(treprostinil) INHALATION  
POWDER

**TYVASO**  
(treprostinil) INHALATION  
SOLUTION

# COMO FUNCIONA

TYVASO é inalado diretamente para os pulmões, onde funciona para ajudar a abrir os vasos sanguíneos

**TYVASO ENTREGA  
RAPIDAMENTE O  
MEDICAMENTO NO LOCAL DA  
DOENÇA, ONDE É  
NECESSÁRIO.**

No estudo clínico, os pacientes que estavam tomando TYVASO tinham maior probabilidade de apresentar tosse, dor de cabeça e irritação/dor na garganta do que apresentaram náusea e diarreia.

## Informações de segurança importantes

**Fale com seu profissional da saúde sobre todos os medicamentos que você toma**, incluindo medicamentos prescritos e de venda livre, vitaminas e suplementos fitoterápicos. O produto e outros medicamentos podem afetar uns aos outros.

**Consulte as informações de segurança importantes nas páginas 20 a 21 e as informações completas de prescrição e instruções de uso anexas para TYVASO e TYVASO DPI no encarte.**

# SUAS OPÇÕES DE DISPOSITIVO TYVASO

O primeiro passo para se sentir confortável com TYVASO é familiarizar-se com seu dispositivo. Converse com seu profissional da saúde para descobrir qual opção é a melhor para você.

## TYVASO DPI (Inalador de pó seco)

TYVASO DPI é inalado usando um inalador pequeno e portátil.

## Nebulizador de TYVASO

TYVASO é inalado usando um nebulizador portátil sem fio.

Encontre mais detalhes e vídeos úteis sobre como usar seu dispositivo TYVASO em [www.TYVASO.com/resources](http://www.TYVASO.com/resources).

## Informações de segurança importantes

Informe seu profissional da saúde especialmente se você tomar:

- medicamentos usados para tratar pressão arterial alta ou doença cardíaca
- medicamentos que diminuem a coagulação do sangue (anticoagulantes)
- Diuréticos
- Gemfibrozil (Lopid®) ou rifampina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)

**TYVASO DPI**  
(treprostinil) INHALATION  
POWDER

**TYVASO**  
(treprostinil) INHALATION  
SOLUTION

# USO DE TYVASO

## TYVASO DPI cabe na palma da mão

TYVASO está disponível em um Inalador de pó seco (DPI).

Este inalador **pequeno e portátil** usa cartuchos e possui um design **simples de usar**.

- Convenientemente **portátil**
- **Carpules de dose única** pré-preenchidos com medicamento
- Apenas **1 inalação** por carpule, **4x/dia**

**Tomar uma dose é tão simples quanto: APENAS UMA RESPIRAÇÃO — ABRIR, CARREGAR, INALAR**

**98%**

**Taxa de satisfação do paciente de 98%** com TYVASO DPI

TYVASO DPI recebeu **altas marcas de satisfação** de 45 de 46 pessoas em um estudo clínico mudaram para o nebulizador de TYVASO.\*

\*No estudo clínico, 51 pessoas com HAP que estavam usando o nebulizador de TYVASO há pelo menos 3 meses mudaram para o TYVASO DPI. Os pesquisadores registraram efeitos colaterais e, após 3 semanas, 46 pacientes classificaram sua satisfação com o TYVASO DPI em um questionário.

TYVASO DPI se encaixa em sua rotina diária



Ao acordar



Almoço



Jantar



Hora de dormir

**É IMPORTANTE QUE VOCÊ USE TYVASO DPI 4X DIARIAMENTE PARA OBTER O BENEFÍCIO TOTAL DO MEDICAMENTO.**

## Informações de segurança importantes

**Quais são os possíveis efeitos colaterais do TYVASO ou do TYVASO DPI?**


Ambos os produtos podem causar **efeitos colaterais graves**, incluindo:

- **Pressão arterial baixa** (hipotensão sintomática). Se você tiver pressão arterial baixa, qualquer um dos produtos poderá reduzir mais sua pressão arterial.
- **Problemas de sangramento**. Qualquer um dos produtos pode aumentar o risco de sangramento, especialmente em pessoas que tomam anticoagulantes (anticoagulantes).

## Alcançar sua dose alvo de manutenção

Seu médico trabalhará com você para aumentar sua dose até que você atinja sua dose alvo de manutenção. Esse processo é chamado de “titulação”.

A maioria das pessoas começa com o carpule de 16 mcg, 4x ao dia, e aumenta sua dose a cada 1 a 2 semanas até atingir sua dose de manutenção alvo.



Se a dose prescrita for superior a 64 mcg por sessão de tratamento, mais de 1 carpule será necessário por sessão.

## Informações de segurança importantes

**Quais são os possíveis efeitos colaterais de TYVASO ou de TYVASO DPI? (continuação)**

Os efeitos colaterais mais comuns de ambos os produtos são tosse, dor de cabeça, irritação e dor na garganta, náusea, vermelhidão da face e pescoço (rubor), desmaio ou perda de consciência, tontura, diarreia e falta de ar. Como outras prostaglandinas inaladas, você pode ter dificuldade para respirar depois de tomar TYVASO ou TYVASO DPI, pois isso pode fazer com que os músculos ao redor de suas vias aéreas se contraíam (broncoespasmo). Estes não são todos os efeitos colaterais possíveis. Entre em contato com seu médico para obter orientação médica sobre efeitos colaterais ou se tiver dificuldade para respirar.

Consulte as informações de segurança importantes nas páginas 20 a 21 e as informações completas de prescrição e instruções de uso anexas para TYVASO e TYVASO DPI no encarte.

**TYVASO DPI**  
(treprostinil) INHALATION POWDER

**TYVASO**  
(treprostinil) INHALATION SOLUTION

# USO DE TYVASO

## O nebulizador de TYVASO se encaixa no seu dia

Este **nebulizador portátil** permite a administração em casa ou fora.

### Uma maneira simples de lembrar: Conte até 4 e adicione mais 1

- 1** Configure o dispositivo **1x cada manhã**
- 2-3** Cada sessão leva cerca de **2 a 3 minutos**
- 4** Tome TYVASO **4x/dia** durante o horário de despertar
- +1** Limpe o dispositivo **1x todas as noites**

TYVASO se encaixa em sua rotina diária



Ao acordar



Almoço



Jantar



Hora de dormir

**É IMPORTANTE QUE VOCÊ TOME TYVASO 4X AO DIA PARA OBTER O BENEFÍCIO TOTAL DO MEDICAMENTO.**

### Informações de segurança importantes

Antes de tomar TYVASO ou TYVASO DPI, informe seu profissional da saúde sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:


- tem pressão arterial baixa
- tem ou tiver tido problemas de sangramento
- tem asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)

Consulte as informações de segurança importantes nas páginas 20 a 21 e as informações completas de prescrição e instruções de uso anexas para TYVASO e TYVASO DPI no encarte.

## Alcançar sua dose alvo de manutenção

Seu médico trabalhará com você para aumentar o número de inalações por sessão a cada semana até que você atinja a dose de manutenção alvo de 9-12 respirações, 4x ao dia. Esse processo é chamado de “titulação”.

Normalmente, as pessoas que usam TYVASO começam com 3 inalações, 4x/dia, e aumentam em 1 inalação a cada semana até atingirem a dose alvo de 9-12 inalações.



\*Seu médico pode recomendar um cronograma um pouco diferente.

## Informações de segurança importantes

Antes de tomar TYVASO ou TYVASO DPI, informe seu profissional da saúde sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você (continuação):

- está grávida ou planeja engravidar. Não se sabe se qualquer um dos produtos prejudicará seu bebê que ainda não nasceu.
- está amamentando ou planeja amamentar. Não se sabe se qualquer um dos produtos passar para o leite materno. Converse com seu profissional da saúde sobre a melhor maneira de alimentar seu bebê durante o tratamento.



## Alcançar sua dose alvo de manutenção para maximizar os benefícios

É importante atingir sua dose alvo de manutenção para que você possa obter o benefício total do medicamento e ser mais ativo.

Na semana 16 do estudo clínico, os pacientes que atingiram **10-12 inalações** com o nebulizador de TYVASO apresentaram uma **melhora 67% maior** na distância do DC6M do que aqueles que alcançaram apenas 7-9 inalações.



7-9 inalações

18 m (59 pés)\*

10-12 inalações

30 m (98 pés)\*

**67%**  
**MAIS**  
**DISTANTE**  
**NA DC6M**

#### DICAS IMPORTANTES PARA TITULAÇÃO

- À medida que você aumenta sua inalação a cada semana, você pode apresentar efeitos colaterais
- Converse com seu enfermeiro ou médico para ajudá-lo a controlar os efeitos colaterais para que você possa atingir sua dose alvo de manutenção e experimentar todos os benefícios do TYVASO
- **NÃO PARE** de tomar TYVASO sem falar com seu profissional da saúde

\*18 metros é cerca de 59 pés. 30 metros é de cerca de 98 pés.

### Informações de segurança importantes

**Fale com seu profissional da saúde sobre todos os medicamentos que você toma**, incluindo medicamentos prescritos e de venda livre, vitaminas e suplementos fitoterápicos. O produto e outros medicamentos podem afetar uns aos outros.

**Consulte as informações de segurança importantes nas páginas 20 a 21 e as informações completas de prescrição e instruções de uso anexas para TYVASO e TYVASO DPI no encarte.**



# Preparação para um novo medicamento

## Você pode ter efeitos colaterais...

Sua equipe de saúde ajudará você a entender sua medicação, incluindo possíveis efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns são tosse, dor de cabeça, irritação e dor na garganta e tontura. Ter um plano para controlar os possíveis efeitos colaterais pode ajudá-lo a se sentir preparado e ficar no caminho certo para obter todos os benefícios do seu medicamento.

**Certifique-se de entrar em contato com seu enfermeiro sobre coisas que você pode fazer para ajudar a controlar os efeitos colaterais enquanto continua o tratamento, como:**

### TOSSE

- ✓ Revisar a técnica adequada
- ✓ antes do tratamento, comer uma pequena quantidade de iogurte, mel ou manteiga de amendoim ou beber água muito fria ou morna

### CEFALEIA

- ✓ usar um analgésico sem receita médica, como o acetaminofeno

### IRRITAÇÃO DA GARGANTA

- ✓ usar um spray para garganta para anestésias a garganta antes do tratamento, se necessário

Converse com seu profissional da saúde para ver se a redução do ritmo em que você aumenta sua dose ou a otimização de outros medicamentos que você está tomando pode ajudar.

**revisar a técnica adequada para o seu dispositivo nos manuais de instruções de uso no bolso ou em [www.TYVASO.com](http://www.TYVASO.com).**

**Essas dicas podem ajudá-lo a controlar os efeitos colaterais comuns do TYVASO, com base na experiência do profissional da saúde. Não se destinam a ser um aconselhamento médico.**

## Informações de segurança importantes

**Informe seu profissional da saúde especialmente se você tomar:**

- medicamentos usados para tratar pressão arterial alta ou doença cardíaca
- medicamentos que diminuem a coagulação do sangue (anticoagulantes)
- Diuréticos
- Gemfibrozil (Lopid®) ou rifampina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)



# APOIO A CADA ETAPA

## Iniciando sua jornada de tratamento com TYVASO



O programa Archways da United Therapeutics é um programa de apoio educacional virtual que oferece informações úteis sobre doenças e recursos para o tratamento. A Archways está disponível gratuitamente para pacientes e cuidadores à medida que você inicia sua jornada de tratamento com TYVASO.

Para começar, siga um desses três simples passos:

- ligue para **1-888-327-2492**
- texto **“INICIAR”** para **882724** (*pode haver taxas de mensagem e dados padrão*)
- visite **www.UTArchways.com**

A United Therapeutics e o programa da Archways não fornecem aconselhamento médico. Você é aconselhado a consultar seu profissional da saúde com relação a quaisquer dúvidas ou preocupações específicas sobre seu tratamento.

## Trabalhando com a farmácia especializada (FE)

TYVASO está disponível apenas por meio de farmácias especializadas, que se concentram em fornecer treinamento em casa e **suporte 24 horas**. Seu profissional de farmácia especializada (FE) faz parte de sua equipe de saúde.

**O que acontece em seguida:** Seu fornecedor da FE ligará para você.

**Atenda à chamada:** quando entrarem em contato com você pela primeira vez, o fornecedor da FE ligará para você a partir de um número **866** ou **877** que você pode não reconhecer. Como eles não podem levar o medicamento até você a menos que falem com você, certifique-se de atender à chamada para começar e permanecer no caminho certo.

Um enfermeiro de FE dará a você instruções pessoais sobre o uso de TYVASO e fornecerá suporte contínuo. Seu enfermeiro da FE pode visitar ou ligar regularmente, pois você está se sentindo à vontade para usar TYVASO.

## Informações de segurança importantes

**Quais são os possíveis efeitos colaterais do TYVASO ou do TYVASO DPI?**

Ambos os produtos podem causar **efeitos colaterais graves**, incluindo:


- **Pressão arterial baixa** (hipotensão sintomática). Se você tiver pressão arterial baixa, qualquer um dos produtos poderá reduzir mais sua pressão arterial.
- **Problemas de sangramento**. Qualquer um dos produtos pode aumentar o risco de sangramento, especialmente em pessoas que tomam anticoagulantes (anticoagulantes).

**Consulte as informações de segurança importantes nas páginas 20 a 21 e as**

informações completas de prescrição e instruções de uso anexas para TYVASO e TYVASO DPI no encarte.



ASSIST pode ajudá-lo a determinar se você se qualifica para os programas de assistência ao paciente da United Therapeutics. Ligue para ASSIST no telefone 1-877-864-8437.



## Programa de assistência Co-Pay

Com o programa de assistência Co-Pay do TYVASO, a maioria dos pacientes elegíveis faz um copagamento de apenas US\$ 5 por cada prescrição de TYVASO ou TYVASO DPI.\*

Saiba como se inscrever em [www.UTcopay.com](http://www.UTcopay.com) ou ligue para ASSIST em 1-877-864-8437.

\*Os requisitos de elegibilidade para este programa são:

- você precisa ter 18 anos de idade ou mais para usar este programa
- pacientes que usam Medicare, Medicaid ou qualquer outro programa governamental estadual ou federal para pagar seus medicamentos não são elegíveis. Os pacientes que começarem a utilizar cobertura governamental durante a vigência do programa não serão mais elegíveis
- o programa é válido apenas para pacientes com seguro comercial (também conhecido como privado) que estejam tomando o medicamento para uma indicação aprovada pela FDA.
- pacientes elegíveis devem ser residentes nos Estados Unidos ou em Porto Rico. O programa está sujeito a restrições legais estaduais adicionais. Os pacientes que residam em estados específicos podem não ser elegíveis para o programa

## Informações de segurança importantes

**Quais são os possíveis efeitos colaterais de TYVASO ou de TYVASO DPI? (continuação)** Os efeitos colaterais mais comuns de ambos os produtos são tosse, dor de cabeça, irritação e dor na garganta, náusea, vermelhidão da face e pescoço (rubor), desmaio ou perda de consciência, tontura, diarreia e falta de ar. Como outras prostaglandinas inaladas, você pode ter dificuldade para respirar depois de tomar TYVASO ou TYVASO DPI, pois isso pode fazer com que os músculos ao redor de suas vias aéreas se contraíam (broncoespasmo). Estes não são todos os efeitos colaterais possíveis. Entre em contato com seu médico para obter orientação médica sobre efeitos colaterais ou se tiver dificuldade para respirar.



# INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de tomar TYVASO ou TYVASO DPI, informe seu profissional da saúde sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:

- Tem pressão arterial baixa
- Tem ou teve problemas de sangramento
- Tem asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
- Está grávida ou planejar engravidar. Não se sabe se qualquer um dos produtos prejudicará seu bebê que ainda não nasceu.
- Está amamentando ou planejando amamentar. Não se sabe se qualquer um dos produtos passa para o leite materno. Converse com seu profissional da saúde sobre a melhor maneira de alimentar seu bebê durante o tratamento.

**Fale com seu profissional da saúde sobre todos os medicamentos que você toma,** incluindo medicamentos prescritos e de venda livre, vitaminas e suplementos fitoterápicos. O produto e outros medicamentos podem afetar uns aos outros.

**Informe seu profissional da saúde especialmente se você tomar:**

- medicamentos usados para tratar pressão arterial alta ou doença cardíaca
- medicamentos que diminuem a coagulação do sangue (anticoagulantes)
- Diuréticos
- Gemfibrozil (Lopid®) ou rifampina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)

**Quais são os possíveis efeitos colaterais do TYVASO ou do TYVASO DPI?**

Ambos os produtos podem causar **efeitos colaterais graves**, incluindo:

- **Pressão arterial baixa** (hipotensão sintomática). Se você tiver pressão arterial baixa, qualquer um dos produtos poderá reduzir mais sua pressão arterial.
- **Problemas de sangramento.** Qualquer um dos produtos pode aumentar o risco de sangramento, especialmente em pessoas que tomam anticoagulantes (anticoagulantes).

**Os efeitos colaterais mais comuns** de ambos os produtos são tosse, dor de cabeça, irritação e dor na garganta, náusea, vermelhidão da face e pescoço (rubor), desmaio ou perda de consciência, tontura, diarreia e falta de ar. Como outras prostaglandinas inaladas, você pode ter dificuldade para respirar depois de tomar TYVASO ou TYVASO DPI, pois isso pode fazer com que os músculos ao redor de suas vias aéreas se contraíam (broncoespasmo). Estes não são todos os efeitos colaterais possíveis. Entre em contato com seu médico para obter orientação médica sobre efeitos colaterais ou se tiver dificuldade para respirar.

**Você pode relatar efeitos colaterais à FDA em [www.fda.gov/MedWatch](http://www.fda.gov/MedWatch) ou ligar para 1-800-FDA-1088.**

## O que são TYVASO e TYVASO DPI?

A solução para inalação TYVASO (treprostinil) e o pó para inalação TYVASO DPI (treprostinil) são medicamentos prescritos usados em adultos para tratar hipertensão pulmonar associada à doença pulmonar intersticial (DPI-PH; Grupo 3 da OMS), que é a alta pressão arterial nos pulmões devido à inflamação e, às vezes, cicatrizes nos pulmões. TYVASO ou TYVASO DPI podem melhorar a capacidade de praticar exercícios.

As informações de risco fornecidas aqui não são abrangentes. Para saber mais sobre o TYVASO ou o TYVASO DPI, converse com seu profissional da saúde. Consulte as informações de prescrição completas do **TYVASO** ou **TYVASO DPI**, os manuais de instruções de uso do **TD-100** e **TD-300 do sistema de inalação do TYVASO®** e do **pó para inalação do TYVASO DPI™**, e as informações adicionais em [www.TYVASO.com](http://www.TYVASO.com) ou ligue para 1-877-UNITHER (1-877-864-8437).

TYVISIconMAY2022(DPI-HP)



**TYVASO DPI**  
(treprostinil) INHALATION  
POWDER



**TYVASO**  
(treprostinil) INHALATION  
SOLUTION

# É sua vez

## CONVERSE COM SEU MÉDICO DO ESTUDO SOBRE UM PLANO PARA AJUDÁ-LO A TIRAR O MÁXIMO PROVEITO DE TYVASO

### TYVASO...

- ✓ é o primeiro e único medicamento aprovado pela FDA para tratar DPI-HP
- ✓ aumenta sua capacidade de permanecer ativo
- ✓ reduz a chance de piora da DPI-HP
- ✓ reduz o esforço de seu coração
- ✓ levado diretamente aos pulmões, onde é necessário
- ✓ levado com opções de dispositivos portáteis que vão aonde você for

### Avance com TYVASO

Obtenha mais informações e inscreva-se para receber atualizações em [www.TYVASOsignup.com](http://www.TYVASOsignup.com).

### Informações de segurança importantes

Antes de tomar TYVASO ou TYVASO DPI, informe seu profissional da saúde sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:

- tem pressão arterial baixa
- tem ou tiver tido problemas de sangramento
- tem asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)

Consulte as informações de segurança importantes nas páginas 20 a 21 e as informações completas de prescrição e instruções de uso anexas para TYVASO e TYVASO DPI no encarte.



TYVASO é uma marca registrada e TYVASO DPI é uma marca comercial da United Therapeutics Corporation.  
© 2022 United Therapeutics Corporation. Todos os direitos reservados. US/TYV/0776 Impresso nos EUA.

**TYVASO DPI**  
*(treprostinil)* INHALATION  
POWDER

**TYVASO**  
*(treprostinil)* INHALATION  
SOLUTION